

40. 褐毛石楠(经济植物手册)

Photinia hirsuta Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:481. 1933; Cheng in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China bot. ser. 10:135. 1936; 徐炳声, 植物分类学报 11:192. 1966; 中国高等植物图鉴 2:215. 图 2160. 1972.

褐毛石楠(原变种) 图版 33:10—14

P. hirsuta Hand.-Mazz. var. **hirsuta**

落叶灌木或乔木, 高 1—2 米; 小枝密生褐色硬毛, 老时黑褐色, 有纵条纹及圆形皮孔; 冬芽卵形, 急尖, 有褐色硬毛。叶片纸质, 椭圆形、椭圆披针形或近卵形, 长 3—7.5 厘米, 宽 1.5—3 厘米, 先端渐尖或尾尖, 基部宽楔形或近圆形, 边缘有疏生具腺锐锯齿, 近基部全缘, 上面光亮, 无毛, 下面中脉有褐色柔毛, 侧脉 5—6 对, 网脉不显; 叶柄短粗, 长 2—4 毫米, 密生褐色硬毛。花 3—8 朵, 成顶生聚伞花序, 直径 8—20 毫米, 无总花梗, 花梗、萼筒外面及萼片均密生褐色硬毛; 花梗长 3—10 毫米; 苞片钻形, 长 4 毫米; 花直径 5—7 毫米; 萼筒钟状, 萼片三角形, 长 2—2.5 毫米; 花瓣白色或带粉红色, 倒卵形, 长约 3 毫米, 内面微有柔毛; 雄蕊 20, 较花瓣稍短; 花柱 2, 中部以下合生, 基部有毛。果实椭圆形, 长约 8 毫米, 红色, 几无毛, 有斑点; 种子椭圆形, 长 2.5 毫米, 黑褐色, 光滑。 花期 4—5 月, 果期 9 月。

产湖南、江西、安徽、浙江、福建。生于山坡疏林中。模式标本采自湖南长沙岳麓山。

本种小枝、叶柄、花梗、萼筒外面及萼片皆密生褐色硬毛, 聚伞花序无总花梗, 易和本属其他种区别。

褐毛石楠裂叶变种

P. hirsuta Hand.-Mazz. var. **lobulata** Yü, 植物分类学报 8:231. 1963.

叶片先端 3 裂如鱼尾状。

产福建。生于杂木林中。模式标本采自连城罗池。

16. 枇杷属——**Eriobotrya** Lindl.

Lindl. in Trans. Linn. Soc. 13:102. 1822; Focke in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(3): 25. 1888; Nakai in Journ. Arn. Arb. 5:62-72. 1924; Vidal in Adansonia 5:537. 1965. —— *Photinia* Benth. & Hook. f. Gen. Pl. 1:627. 1865. P. P.

常绿乔木或灌木。单叶互生, 边缘有锯齿或近全缘, 羽状网脉显明: 通常有叶柄