

毛;花直径 12—20 毫米;萼筒浅杯状,长 4—5 毫米,萼片三角卵形,长 2—3 毫米,先端急尖,萼筒及萼片外面有锈色绒毛;花瓣白色,长圆形或卵形,长 5—9 毫米,宽 4—6 毫米,基部具爪,有锈色绒毛;雄蕊 20,远短于花瓣,花丝基部扩展;花柱 5,离生,柱头头状,无毛,子房顶端有锈色柔毛,5 室,每室有 2 胚珠。果实球形或长圆形,直径 2—5 厘米,黄色或桔黄色,外有锈色柔毛,不久脱落;种子 1—5,球形或扁球形,直径 1—1.5 厘米,褐色,光亮,种皮纸质。花期 10—12 月,果期 5—6 月。

产甘肃、陕西、河南、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、四川、云南、贵州、广西、广东、福建、台湾。各地广行栽培,四川、湖北有野生者。日本、印度、越南、缅甸、泰国、印度尼西亚也有栽培。

美丽观赏树木和果树。果味甘酸,供生食、蜜饯和酿酒用;叶晒干去毛,可供药用,有化痰止咳,和胃降气之效。木材红棕色,可作木梳、手杖、农具柄等用。

2. 麻栗坡枇杷

Eriobotrya malipoensis Kuan, 植物分类学报 8:231. 1963; Vidal in Adansonia 5:551. 1965.

乔木,高 10—15 米,枝粗壮,有锈色绒毛。叶片革质,长圆形或长圆倒卵形,长 30—40 厘米,宽 10—15 厘米,先端急尖,基部渐狭,边缘有疏生波状齿,上面光亮,无毛,下面密生锈色绒毛,中脉粗壮,侧脉 20—25 对;叶柄约长 1 厘米,密生锈色绒毛。圆锥花序顶生,纵横直径均 8—10 厘米,总花梗和花梗密生锈色绒毛,花梗长 2—4 毫米;苞片及小苞片披针形,长 3—5 毫米,密生锈色绒毛;花直径约 1 厘米;萼筒杯状,长 3—4 毫米;萼片卵形,长 2—3 毫米,萼筒及萼片外面有锈色绒毛,内面无毛;花瓣白色,倒卵形,长 5—6 毫米,先端圆钝,内面有锈色柔毛,外面无毛,基部有短爪;雄蕊 20,约长 3 毫米;花柱 3—5,离生,被柔毛,子房顶端被柔毛。花期 1 月。

产云南东南部。生于山谷密林中,海拔 1200—1500 米。模式标本采自麻栗坡。

本种的特点为叶片长大,叶片下面、叶柄及花序均密生锈色绒毛。与枇杷 *E. japonica* (Thunb.) Lindl. 相近,但后者叶片为披针形、倒披针形、倒卵形或椭圆长圆形,上面多皱,下面密生灰棕色绒毛,侧脉对数较少,11—21 对;花柱 5,易于区别。

3. 栎叶枇杷 图版 36:1—4

Eriobotrya prinoides Rehd. & Wils. in Sarg. Pl. Wils. 1: 194. 1912; Schneid.

图版 36: 1—4. 栎叶枇杷 *Eriobotrya prinoides* Rehd. & Wils., 1. 花枝×1; 2. 花纵剖面×2; 3. 果实×2; 4. 果实横剖面×2。5—8. 台湾枇杷 *Eriobotrya deflexa* (Hemsl.) Nakai f. *deflexa*, 5. 花枝×1; 6. 花纵剖面×2; 7. 果实×2; 8. 果实横剖面×2。(吴影桦绘)