

色,倒卵形,长6—8毫米,先端圆钝或微缺,无毛;雄蕊20,长约5毫米;花柱2或3,长约3毫米,在中部或全部合生,有棕色长柔毛,子房2—3室,顶端密生柔毛。果实近球形,直径约7毫米,密生棕黄色绒毛。花期4—5月,果期9—10月。

产云南西部。生于山坡杂木林中,海拔1700—2500米。模式标本采自腾冲。缅甸也有分布。

本种的主要特征为叶片长圆形、椭圆形或近倒卵形,边缘中部以上有少数疏生尖齿,中部以下全缘;花梗极短或近无梗;果实密生棕黄色绒毛。若和大花枇杷 *E. cavaleriei* (Lévl.) Rehd. 比较,后者叶片长圆形、长圆披针形或长圆倒披针形,边缘疏生内曲浅锐锯齿,近基部全缘;花梗长3—10毫米;子房顶端无毛;果实无毛或微有柔毛,可以区别。

5. 怒江枇杷

Eriobotrya salwinensis Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:475. 1933; Vidal in Adansonia 5:571. pl. 4:1-3. 1965.

小乔木;小枝粗壮,幼时密生棕色绒毛,以后逐渐脱落成无毛,呈黑灰色。叶片厚革质,倒卵披针形,长10—20厘米,宽2.5—6.5厘米,先端渐尖,基部楔形,有时近圆形,边缘先端四分之一每侧有4—10浅锯齿,上面光亮,无毛,下面有黄色长柔毛,侧脉14—20对,有显明网脉;叶柄肥厚,近圆柱形,长2—3厘米,有绒毛。圆锥花序金字塔形,直径达15厘米,总花梗及花梗肥厚,密生棕色绒毛,在花序上部的花成穗状,无梗;小苞片2,卵形,长2毫米;萼筒长5毫米,外面有棕色短绒毛;萼片卵形,和萼筒等长,先端圆钝;花瓣乳黄色,倒卵形,长5毫米,先端截形微缺,常2深裂,有黄色长柔毛;雄蕊20,长2.5毫米;花柱2—3,离生,长2毫米,基部及子房有棕色长柔毛。果实球形,直径约15毫米,肉质,具颗粒状突起,基部和顶端全有棕色柔毛;种子通常1,直径1厘米,种皮薄,褐色,光亮。花期4—5月,果期6—8月。

产云南西北部。生于亚热带季雨阔叶林中,海拔1600—2400米。模式标本采自贡山。缅甸和印度也有分布。

6. 香花枇杷

Eriobotrya fragrans Champ. ex Benth. in Journ. Bot. Kew Misc. 4:80. 1852; Benth. Fl. Hongk. 108. 1861; Dcne. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris 10:145. 1874; Dunn & Tutchter in Kew Bull. add. ser. 10:97. 1912; Nakai in Journ. Arn. Arb. 5:71. 1924; Vidal in Adansonia 5:555. 1965 & in Fl. Camb. Laos et Vietn. 6:68. 1968.