

## 8. 倒卵叶枇杷

*Eriobotrya obovata* W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb. **10**:29. 1917; Nakai in Journ. Arn. Arb. **5**:69. 1924; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:477. 1933; Vidal in *Adansonia* **5**:570. 1965 & in *Fl. Camb. Laos et Vietn.* **6**:71. pl. 11:1-2. 1968.

乔木, 高约 10 米; 小枝粗壮, 暗灰色, 初生锈色绒毛, 后脱落无毛。叶片革质, 倒卵形或倒披针形, 长 5—15 厘米, 宽 2—6 厘米, 先端圆形或短渐尖, 基部楔形, 边缘有尖锐内弯锯齿, 间隔约 5 毫米, 近基部全缘, 上面光亮或近光亮, 两面皆无毛, 中脉在两面隆起, 侧脉 10—14 对; 叶柄 1.5—3 厘米, 无毛。圆锥花序顶生, 开展, 长 6 厘米, 总花梗、花梗及花萼皆密生棕色绒毛; 花梗粗壮, 长 2—4 毫米; 花直径 1—1.5 厘米; 萼筒杯状, 长 3—5 毫米, 萼片三角卵形, 长 3—4 毫米; 花瓣白色, 倒卵形, 长 5—7 毫米, 先端圆钝或微缺, 基部具短爪, 并有棕色绒毛; 雄蕊 20, 较花瓣短; 花柱 2—3, 约和雄蕊等长, 中部以下有白色长柔毛, 子房密生柔毛。果实未见。花期 3 月。

产云南。生于山坡丛林中。模式标本采自昆明附近。

本种和越南产的南亚枇杷缩花变型 *E. bengalensis* (Roxb.) Hook. f. forma *contracta* Vidal 相近, 但后者叶片披针形或倒披针形, 先端锐或钝, 边缘有锯齿, 间隔 6—10 毫米, 花序紧缩, 可以区别。本种若和栎叶枇杷 *E. prinoides* Rehd. & Wils. 相比, 在于后者叶片长圆形或椭圆形, 下面密生灰色绒毛, 花柱 2, 可以区别。

## 9. 南亚枇杷 云南枇杷(中国树木分类学)

*Eriobotrya bengalensis* (Roxb.) Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* **2**:371. 1878; Card. in *Fl. Gén. Indoch.* **2**:677. 1920; Ridley, *Fl. Malay. Penin.* **1**:681. 1922; Craib, *Fl. Siam. Enum.* **1**:579. 1931; Vidal in *Adansonia* **5**:567. 1965 & in *Fl. Camb. Laos et Vietn.* **6**:75. pl. 12:4-5. 1968. — *Mespilus bengalensis* Roxb., *Cat. Hort. Beng.* **38**. 1814, nom. nuda & *Fl. Ind.* **2**:510. 1832.

### 南亚枇杷(原变型)

*E. bengalensis* (Roxb.) Hook. f. forma *bengalensis*

常绿乔木, 高可达 10 米以上。叶片长圆形、椭圆形或披针形, 长 10—20 厘米, 宽 4—8 厘米, 先端渐尖, 基部楔形, 边缘有深刻尖锐锯齿, 上面光亮, 两面皆无毛, 侧脉约 10 对; 叶柄长 2—4 厘米。花成展开的圆锥花序, 长和宽 8—12 厘米, 有绒毛; 花梗长 3—5 毫米; 萼筒长 2—3 毫米, 外面有绒毛, 萼片长 1 毫米, 钝或稍锐; 花瓣白色, 倒卵形或近圆形, 长 4—5 毫米, 顶端圆形或微缺, 无毛或内面基部有柔毛; 雄蕊约 20; 花柱 2—3, 基部有毛, 子房顶端具毛。果实卵球形, 直径 10—15 毫米, 有 1—2 个大