

叶片长圆形至倒披针形,长4—5厘米,宽1.5—2厘米,先端圆钝,边缘上半部有锯齿;花序具少数花,疏生柔毛;苞片披针形,长约4毫米,花梗长7—15毫米,萼片长约3毫米。

产台湾(恒春半岛)。

石斑木毛序变种

R. indica (L.) Lindl. var. **tashiroi** Hayata ex Matsumura & Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 22:129. 1906 (Enum. Pl. Formos.). p. p.; Nakai in Journ. Arn. Arb. 5:66. 1924; Kanehira, Formos. Trees 277. f. 227. 1936; Li in Lloydia 4: 235. 1952 & Woody Fl. Taiwan 293. 1960.

叶片长椭圆形或披针状长椭圆形,长5—7厘米,宽1.5—2厘米,先端急尖,近缘有粗锯齿;花序具多花,密生绒毛,苞片披针形,长约7毫米,花梗长3—10毫米,萼片长约4毫米。

产台湾中部和北部,生于海拔700—1000米。

2. 大叶石斑木 图版 38:1—4

Raphiolepis major Card. in Lecomte, Not Syst. 3:380. 1918; Nakai in Journ. Arn. Arb. 5:62. 1924.——*R. indica* var. *grandifolia* Franch. in Herb. Mus. Paris & in Bull. Soc. Bot. France 46:207. 1899 (errore typographico: grandiflora).

常绿灌木,高可达4米,树皮光滑;小枝粗壮,灰色,几无毛。叶片长椭圆形或倒卵状长圆形,长7—15厘米,宽4—6厘米,先端急尖或短渐尖,基部楔形下延,边缘略向下卷,有浅钝锯齿,上面无毛或幼时叶脉被疏毛,中脉在上面凸起,侧脉及网脉均下陷成皱,下面苍白,中脉凸起,侧脉8—14对,未达叶缘前即分叉;叶柄具翅,长1.5—2.5厘米,近无毛。圆锥花序长约12厘米;总花梗、花梗、苞片及小苞片均被锈色绒毛;花梗长7—15毫米;花直径13—15毫米;萼筒筒状,上部宽大,长约4毫米,外面被锈色绒毛,内面无毛;萼片三角披针形,先端长渐尖,长5—6毫米,外面微被毛,内面先端有锈色绒毛;花瓣卵形,长5—7毫米,宽4.5—5.5毫米,先端稍急尖或圆钝,基部有毛;雄蕊15,约与花瓣等长或短于花瓣;花柱2,基部合生,子房被毛。果实球形,黑色,直径7—10毫米;果梗粗壮,长8—15毫米,被棕色绒毛;种子1,圆形,黑色,直

图版 38: 1—4. 大叶石斑木 *Raphiolepis major* Card., 1. 花枝×1; 2. 花纵剖面×3; 3. 果枝×1; 4. 果实横剖面×2。5—6. 柳叶石斑木 *Raphiolepis salicifolia* Lindl., 5. 花枝×1; 6. 花纵剖面×3。7—8. 锈毛石斑木 *Raphiolepis ferruginea* Metcalf var. *ferruginea*, 7. 果枝×1; 8. 果实横剖面×2。(吴彰桦绘)