

雄蕊或与雄蕊近等长,基部微具柔毛。果实球形,直径6—8毫米,粉红色,先端萼片直立宿存。花期5—6月,果期9—10月。

产云南西北部高山地区。生于多石坡地或矮生灌木丛中,海拔3000—4000米。模式标本采自云南高黎贡山。

本种与铺地花楸 *S. reducta* Diels 同为产于我国西南部高山地区的矮小灌木,但两者易于区别。本种在叶轴、花梗和总花梗上多具锈褐色柔毛,叶片上下两面均无毛,花瓣和果实均粉红色,而铺地花楸在叶轴、花梗和总花梗多有白色柔毛,叶片上面有稀疏长柔毛,花瓣和果实均白色。又本种与红毛花楸 *S. rufopilosa* Schneid. 相近似,惟后者小叶片对数较多(8—14),花序也较长大,可以区别。

系6. 梯叶系 *Ser. Scalares* Yü, 植物分类学报 8:223. 1963.

本系有以下6种:

40. 宾川花楸 图版 45:1—3

*Sorbus obsoletidentata* (Card.) Yü, comb. nov.——*Pirus obsoletidentata* Card. in Lecomte, Not. Syst. 3:353. 1918.

灌木;小枝无毛,棕灰色,具少数皮孔;冬芽卵形,先端急尖或短渐尖,有数枚暗红褐色鳞片,外被褐色柔毛。奇数羽状复叶,连叶柄长6—9厘米,叶柄长约1厘米;小叶片11—14对,间隔4—8毫米,线状长圆形至长圆披针形,长1.2—2.3厘米,宽4—6毫米,先端急尖或稍钝,基部圆形稍偏斜,全缘或少数在叶片先端有2—3浅锯齿,上面暗绿色,无毛,下面色浅,在中脉上微具褐色柔毛或几无毛;叶轴两侧微具窄翅,上面有沟,下面被稀疏褐色柔毛;托叶膜质,披针形,全缘,脱落。复伞房花序小形,具密集花朵,总花梗和花梗被褐色柔毛;花梗短,长1—2毫米;花直径5—6毫米;萼筒钟状,外有褐色柔毛,内面无毛;萼片三角卵形,先端急尖或圆钝,外面微具柔毛或近无毛,内面有稀疏带褐色柔毛;花瓣卵形,先端圆钝,长3—4毫米,宽2—3毫米,白色,内面无毛或微具柔毛;雄蕊20,长约为花瓣之半或更短;花柱通常4,与雄蕊近等长,无毛。果实不详。

产云南西北部,模式标本采自宾川。

本种的特点为具有11—14对线状长圆形至长圆披针形全缘的小叶片,少数小叶片在先端有2—3浅齿,叶轴、花序和小叶片下面均被褐色柔毛。其近缘种为蕨叶花楸 *S. pteridophylla* Hand.-Mazz., 但后者小叶片形状稍大,对数稍少,在小叶片先端有4—10尖锐锯齿,萼筒外面无毛,可以区别。

