

本种与西南花楸 *S. rehderiana* Koehne 的异点,在其小枝较细,小叶片对数较多,花序上被毛较少,果实白色。

我国西北各地山区森林中习见,枝叶秀丽,秋季结实累累,可栽培供观赏。

51. 西康花楸 蒲氏花楸(华北经济植物志要)

Sorbus prattii Koehne in Sarg. Pl. Wils. 1:468. 1913; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 9:66. 1928; Sealy in Curtis's Bot. Mag. 159: t. 9460. 1936. excl. plant. depict. —*S. munda* Koehne in Sarg. Pl. Wils. 1:469. 1913. —*S. munda* Koehne f. *tatsienensis* Koehne, l. c. 469. —*S. munda* Koehne f. *subarachnoidea* Koehne, l. c. 469. —*S. pogonopetala* Koehne, l. c. 473. —*S. unguiculata* Koehne, l. c. 474. —*S. prattii* Koehne var. *tatsienensis* Schneid. in Bot. Gaz. 63: 404. 1917; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:470. 1933. —*S. hoi* Fang, nom. nud. in herb.

西康花楸(原变种) 图版 44:1—4

S. prattii Koehne var. ***prattii***

灌木,高 2—4 米;小枝细弱,圆柱形,暗灰色,具少数不明显的皮孔,老时无毛;冬芽较小,卵形,先端急尖,具数枚暗红褐色鳞片,外被稀疏棕褐色短柔毛。奇数羽状复叶,连叶柄共长 8—15 厘米,叶柄长 1—2 厘米;小叶片 9—13(—17)对,间隔 6—10 毫米,长圆形,稀长圆卵形,长 1.5—2.5 厘米,宽 5—8 毫米,先端圆钝或急尖,基部偏斜圆形,边缘仅上半部或 2/3 以上部分有尖锐细锯齿,每侧齿数 5—10,其余部分近全缘,上面深绿色,无毛,下面密被乳头状突起,沿中脉有稀疏柔毛;叶轴有窄翅,具稀疏柔毛或近于无毛,上面具沟;托叶草质或近于膜质,披针形,有时分裂,脱落。复伞房花序多着生在侧生短枝上,排列疏松,总花梗和花梗有稀疏白色或黄色柔毛,成长时逐渐脱落,至果期几无毛;花梗长 2—3 毫米;萼筒钟状,内外两面均无毛;萼片三角形,先端圆钝,外面无毛,内面微具柔毛;花瓣宽卵形,长约 5 毫米,宽 4 毫米,先端圆钝,白色,无毛;雄蕊 20,长约为花瓣之半;花柱 5 或 4,几与雄蕊等长,基部无毛或微具柔毛。果实球形,直径约 7—8 毫米,白色,先端有宿存闭合萼片。花期 5—6 月,果期 9 月。

产四川西部、云南西北部和西藏东南部。生于高山杂木丛林内,海拔 2100—3700 米,习见。模式标本采自四川康定。

本种和陕甘花楸 *S. koehneana* Schneid. 最近似,区别在于后者小叶片边缘几乎全部有锯齿,锯齿较粗,叶片下面近于无毛,无乳头状突起。与川滇花楸 *S. vilmorinii* Schneid. 的区别在于后者具粉红色果实,萼筒外被锈褐色柔毛,小叶片基部常呈宽楔