

故改名为 *P. lindleyi* Rehd., 但本书作者在我国梨属标本中, 至今尚未发现有符合前列特点的植物。附志于此, 留待考订。

## 2. 河北梨(中国果树志) 图版 49:6—10

*Pyrus hopeiensis* Yü, 植物分类学报 8: 232. 1963.

乔木, 高达 6—8 米; 小枝圆柱形, 微带稜条, 无毛, 暗紫色或紫褐色, 具稀疏白色皮孔, 先端常变为硬刺; 冬芽长圆卵形或三角卵形, 先端急尖, 无毛, 或在鳞片边缘及先端微具绒毛。叶片卵形, 宽卵形至近圆形, 长 4—7 厘米, 宽 4—5 厘米, 先端具有长或短渐尖头, 基部圆形或近心形, 边缘具细密尖锐锯齿, 有短芒, 上下两面无毛, 侧脉 8—10 对; 叶柄长 2—4.5 厘米, 有稀疏柔毛或无毛。伞形总状花序, 具花 6—8 朵, 花梗长 12—15 毫米, 总花梗和花梗有稀疏柔毛或近于无毛; 萼片三角卵形, 边缘有齿, 外面有稀疏柔毛, 内面密被柔毛; 花瓣椭圆倒卵形, 基部有短爪, 长 8 毫米, 宽 6 毫米, 白色; 雄蕊 20, 长不及花瓣之半; 花柱 4, 和雄蕊近等长。果实球形或卵形, 直径 1.5—2.5 厘米, 果褐色, 顶端萼片宿存, 外面具多数斑点, 4 室, 稀 5 室, 果心大, 果肉白色, 石细胞多; 果梗长 1.5—3 厘米; 种子倒卵形, 长 6 毫米, 宽 4 毫米, 暗褐色。 花期 4 月, 果期 8—9 月。

产河北、山东。生于山坡丛林边, 海拔 100—800 米。模式标本采自河北昌黎。

本种近似秋子梨 *P. ussuriensis* Maxim. 和褐梨 *P. phaeocarpa* Rehd., 唯前者的果实为黄色, 不具明显斑点; 后者叶边锯齿较粗, 不具芒, 果实萼片脱落, 可以区别。本种可能为秋子梨与褐梨的天然杂交种。

本种过去曾经命名为麻梨 *P. serrulata* Rehd., 但叶边具有带芒状细锐锯齿, 萼片全部宿存, 果点显著, 在形态上与麻梨大有差异, 同时麻梨分布地点在长江到珠江流域各地, 本种分布限于我国北部。

## 3. 新疆梨(中国果树志)

*Pyrus sinkiangensis* Yü, 植物分类学报 8: 233. 1963; 中国高等植物图鉴 2: 230. 图 2190. 1972.

乔木, 高达 6—9 米, 树冠半圆形, 枝条密集开展; 小枝圆柱形, 微带稜条, 无毛, 紫褐色或灰褐色, 具白色皮孔; 冬芽卵形, 先端急尖, 鳞片边缘具白色柔毛。叶片卵形、椭圆形至宽卵形, 长 6—8 厘米, 宽 3.5—5 厘米, 先端短渐尖头, 基部圆形, 稀宽楔形, 边缘上半部有细锐锯齿, 下半部或基部锯齿浅或近于全缘, 两面无毛, 或在幼嫩时具白色绒毛; 叶柄长 3—5 厘米, 幼时具白色绒毛, 不久脱落; 托叶膜质, 线状披针形, 长 8—10 毫米, 先端渐尖, 边缘具有稀疏腺齿, 被白色长绒毛, 早期脱落。伞形总状花

