

28. 椭圆悬钩子

Rubus ellipticus Smith in Rees, Cyclop. 30: Rubus no. 16. 1819; DC. Prodr. 2: 563. 1825; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 336. 1878; Focke, Bibl. Bot. 72(2): 198. 1911 et l. c. 83: 46. 1914; Card. in Fl. Gén. Indo-Chine 2: 648. 1920; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 506. 1933; Hara et Ohashi in Fl. E. Himal 129. 1966; Thuan in Fl. Camb. Laos et Vietn. 7: 33 1968. excl. syn. *R. pinfaensis* Lévl. et Vant.

28a. 椭圆悬钩子(原变种)

R. ellipticus Smith var. **ellipticus**

灌木,高1—3米;小枝紫褐色,被较密的紫褐色刺毛或有腺毛,并具柔毛和稀疏钩状皮刺。小叶3枚,椭圆形,长4—8(12)厘米,宽3—6(9)厘米,顶生小叶比侧生者大得多,顶端急或突尖,基部圆形,上面叶脉下陷,沿中脉有柔毛,下面密生绒毛,叶脉突起,沿叶脉有紫红色刺毛,边缘具不整齐细锐锯齿;叶柄长2—6厘米,顶生小叶柄长2—3厘米,侧生小叶近无柄,均被紫红色刺毛、柔毛和小皮刺;托叶线形,具柔毛和腺毛。花数朵至十几朵,密集成顶生短总状花序,或腋生成束,稀单生;花梗短,长4—6毫米,具柔毛,有时也具刺毛;苞片线形,有柔毛;花直径1—1.5厘米;花萼外面被带黄色绒毛和柔毛或疏生刺毛;萼片卵形,顶端急尖而具短尖头,外面密被黄灰色绒毛,在花果期均直立;花瓣匙形,边缘啮蚀状,具较密柔毛,基部具爪,白色或浅红色;花丝宽扁,短于花柱;花柱无毛,子房具柔毛。果实近球形,直径约1厘米,金黄色,无毛或小核果顶端具柔毛;核三角卵球形,密被皱纹。花期3—4月,果期4—5月。

产四川、云南、西藏。生于干旱山坡、山谷或疏林内,海拔1000—2500米。巴基斯坦、锡金、尼泊尔、不丹、印度东北部、斯里兰卡、缅甸、泰国、老挝、越南、印度尼西亚、菲律宾也有分布。

28b. 栽秧泡(变种)(中国高等植物图鉴) 黄泡(云南)

R. ellipticus Smith var. **obcordatus** (Franch.) Focke, Bibl. Bot. 72(2): 199. 1911 et l. c. 83: 46. f. 13. 1914; Card. in Fl. Gén. Indo-Chine 2: 649. 1920; 中国高等植物图鉴 2: 282. 图 2294. 1972. ——*R. ellipticus* Smith f. *obcordatus* Franch. Pl. Delav. 206. 1890. ——*R. obcordatus* (Franch.) Thuan in Fl. Camb. Laos et Vietn. 7: 34. 1968.

和上述变种区别在于叶较小,长2—5.5厘米,宽1.5—4(5)厘米,倒卵形,顶端浅心形或近截形;花梗和花萼上几无刺毛。

产广西、四川、云南、贵州。生山坡、路旁或灌丛中,海拔300—2000米。印度、老挝、泰国、越南也有分布。

枝、叶供药用。

29. 华西悬钩子 图版 6: 1—2

Rubus stimulans Focke in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. 5(no. 23): 74. pl. 65.