

片边缘具绒毛,在花时直立开展,果时常反折;花瓣长倒卵形或长圆形,白色,基部具爪;雄蕊和雌蕊均多数;花柱和子房无毛。果实近球形,直径达 1.5 厘米,红色,无毛。花期 4—5 月,果期 6—7 月。

产浙江、福建、广东、广西、四川、贵州、云南。生山坡、山麓、河边或山谷密林中,海拔 800—2500 米。

本种和腺毛大红泡 *R. eustephanus* Focke ex Diels var. *glanduliger* Yü et Lu 相近,但后者仅于花枝或花梗上疏生短腺毛;小枝常有棱角;小叶常 3—5 枚,稀 7 枚,卵形、椭圆形,稀卵状披针形;花单生,稀 2—3 朵。

Sasaki 发表李栋山悬钩子 *R. ritozanensis* Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formos. 21:250. 1931. 据记载,此种和光滑悬钩子 *R. tsangii* Merr. 相近,区别在其植株无腺毛;小叶 9—11 枚,稀 7 枚;花梗甚短,长约 5 毫米。因未见标本和模式照片,暂附于此。

R. croceacanthus Lévl. var. *glaber* Koidz. Fl. Symb. Or. As. 65. 1930. 本变种产台湾,全株除疏生腺毛外,均几无毛;枝具疏皮刺;小叶 5—9 枚,宽披针形至卵形,边缘具重锯齿或不整齐锯齿,两面几无毛;托叶线形或线状披针形。花单生或成对。果实球形。据记载,此变种和光滑悬钩子难于区分,疑是同物异名。

57b. 无腺光滑悬钩子(变种)

R. tsangii Merr. var. *linearifoliolus* (Hayata) Yü et Lu, stat. nov. — *R. linearifoliolus* Hayata, Icon. Pl. Formos. 7:22. f. 16a. 1918; Liu et Su in Fl. Taiwan 3:116. 1977. — *R. rosaefolius* Smith var. *linearifolius* (Hayata) Li, Woody Fl. Taiwan 315. 1963.

本变种植株无腺毛,小叶片较狭窄,与原变种可以区分。

产我国台湾。生中部和东部的中海拔至高海拔地区。

58. 空心泡(中国高等植物图鉴) 蔷薇莓,三月泡,划船泡,龙船泡,倒触伞,七时饭消扭

Rubus rosaefolius Smith, Plant. Icon. Hact. Inéd. 3:60. 1791; Kurz, For. Fl. Brit. Burm. 1:439. 1877; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2:341. 1878; Hook. in Curtis's Bot. Mag. 113:t. 6970. 1887; Diels in Engler, Bot. Jahrb. 29:399. 1910; Focke, Bibl. Bot. 72(2):153. f. 65. 1911; Card. in Fl. Gén. Indo-Chine 2:644. 1920; 广州植物志 291, 1956; 中国高等植物图鉴 2: 274, 图 2277, 1972. — *R. minusculus* Lévl. et Vant. in Bull. Soc. Agric. Sci. Arts Sarthe 40:63. 1905; Lévl. in Bull. Acad. Géog. Bot. 20 (Mém.):129. 1909; Focke, Bibl. Bot. 72(1):29. 1910 et l. c. 83:18. f. 1. 1914; Card. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 23:295. 1917; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 18:41. 1937; Ohwi, Fl. Jap. 643. 1953 et Fl. Jap. (Engl. ed.) 534. 1965. syn. nov. — *R. thunbergii* Sieb. et Zucc. var. *glabellus* Focke in Sarg. Pl. Wils. 1:52. 1911; Chun in Sunyatsenia 4(3—4): 212. 1940. syn. nov. —