

R. glandulosopunctatus Hayata in Icon. Pl. Formos. 4:5. 1914. syn. nov. — *R. parvirosae-folius* Hayata in l. c. 5:54. 1915.

58a. 空心泡(原变种) 图版 10: 3—5

R. rosaefolius* Smith var. *rosaefolius

直立或攀援灌木,高2—3米;小枝圆柱形,具柔毛或近无毛,常有浅黄色腺点,疏生较直立皮刺。小叶5—7枚,卵状披针形或披针形,长3—5(7)厘米,宽1.5—2厘米,顶端渐尖,基部圆形,两面疏生柔毛,老时几无毛,有浅黄色发亮的腺点,下面沿中脉有稀疏小皮刺,边缘有尖锐缺刻状重锯齿;叶柄长2—3厘米,顶生小叶柄长0.8—1.5厘米,和叶轴均有柔毛和小皮刺,有时近无毛,被浅黄色腺点;托叶卵状披针形或披针形,具柔毛;花常1—2朵,顶生或腋生;花梗长2—3.5厘米,有较稀或较密柔毛,疏生小皮刺,有时被腺点;花直径2—3厘米;花萼外被柔毛和腺点;萼片披针形或卵状披针形,顶端长尾尖,花后常反折;花瓣长圆形、长倒卵形或近圆形,长1—1.5厘米,宽0.8—1厘米,白色,基部具爪,长于萼片,外面有短柔毛,逐渐脱落;花丝较宽;雌蕊很多,花柱和子房无毛;花托具短柄。果实卵球形或长圆状卵圆形,长1—1.5厘米,红色,有光泽,无毛;核有深窝孔。花期3—5月,果期6—7月。

产江西、湖南、安徽、浙江、福建、台湾、广东、广西、四川、贵州。生山地杂木林内阴处、草坡或高山腐植质土壤上,海拔达2000米。印度、缅甸、泰国、老挝、越南、柬埔寨、日本、印度尼西亚(爪哇)、大洋洲、非洲、马达加斯加也有。

根、嫩枝及叶入药,味苦、甘、涩,性凉,有清热止咳、止血、祛风湿之效。

本种分布区宽广,适应性强,植株上腺之有无,枝、叶柄、叶片和花梗被毛之程度,小叶之宽窄,花瓣与萼片之长短均有明显变异。过去一些植物学家对此种的划分较混乱。我们未见到模式标本,经研究我国华东、中南及华南地区的植物,对照印度尼西亚和菲律宾标本,参考原始记载,发现我国和印度尼西亚及菲律宾的植物应属同种,植株具柔毛或近无毛,被浅黄色无柄的透明腺点,并非具腺毛。在本种原始记载中,并无记述植株是否具腺毛或腺体, Focke 在 Bibl. Bot. 72(2):153. 1911 中,记载叶有无柄腺,这和上述地区大量标本的特征相一致。作为同种,完全合理。

58b. 重瓣空心泡(变种) 茶藨花(经济植物手册),佛见笑(云南)


***R. rosaefolius* Smith var. (subsp.) *coronarius* (Sims) Focke, Bibl. Bot. 72(2):155. 1911. — *R. coronarius* Sims in Bot. Mag. t.1783. 1816.**

花重瓣,白色,芳香,直径3—5厘米。花期6—7月。

通常庭园栽培供观赏。在陕西和云南(大理雪人峰半山)均采到标本。印度、印度尼西亚、马来西亚也有分布。

59. 大红泡(中国高等植物图鉴)

***Rubus eustephanus* Focke ex Diels in Engler, Bot. Jahrb. 36:54. 1905 “eustephanos”;**



1—2.光滑悬钩子 *Rubus tsangii* Merr.: 1.花枝, 2.果实。3—5.空心泡 *Rubus rosaefolius* Smith: 3.花枝, 4.花纵剖面, 5.果实。6—7.刺莓 *Rubus taiwanianus* Matsum.: 6.花枝, 7.果实。(刘春荣绘)