

此种近似桤叶悬钩子 *R. fraxinifolius* Hayata, 区别在于后者小叶常 5 枚, 花单生或成对。本种和东南亚产的 *R. fraxinifolius* Poir. 近缘, 后者叶边常具尖锐单锯齿; 花梗有时疏生腺毛; 花较大, 直径 2—3 厘米; 心皮极多 (约 500—1000); 果实较大, 圆锥状, 长约 2 厘米。

61b. 兰屿悬钩子(变种) 兰屿桤叶悬钩子(台湾植物志)

R. alnifoliolatus Lévl. var. ***kotoensis*** (Hayata) Li, Woody Fl. Taiwan 320. 1963; Liu et Su in Fl. Taiwan 3: 108. 1977. — *R. fraxinifolius* Poir. var. *kotoensis* (Hayata) Koidz. in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 34 (2): 144. 1913. — *R. kotoensis* Hayata, Icon. Pl. Formos. 3:90. 1913.

本变种全株无刺。

产我国台湾兰屿向阳地区。

62. 蓬蘽(江苏南部种子植物手册) 泼盎(植物名实图考), 三月泡, 割田蘽, 野杜利

Rubus hirsutus Thunb. in Diss. Bot.-Med. de Rubo 7. 1813; Ohwi, Fl. Jap. 643. 1953 et Fl. Jap. (Engl. ed.) 535. 1965; 江苏南部种子植物手册 364. 图 585. 1965; 中国高等植物图鉴 2: 275. 2279. 1972. — *R. thunbergii* Sieb. & Zucc. in Abh. Math.-phys. Cl. Akad. Wiss. Münch. 4: 246. 1844, non Blume 1826; Focke, Bibl. Bot. 72(2): 158. 1911. — *R. argyi* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 4:333. 1907. — *R. talaikjaensis* Lévl. in l. c. 4: 334. 1907. — *R. stephanandria* Lévl. in l. c. 8: 358. 1910; Focke, l. c. 83: 40. 1914. — *R. thunbergii* Sieb. et Zucc. var. *argyi* (Lévl.) Focke, l. c. 72(2): 160. 1911. — *R. thunbergii* Sieb. et Zucc. var. *talaikjensis* (Lévl.) Focke, l. c. 72(2): 160. 1911. — *R. hirsutus* Thunb. var. *argyi* (Lévl.) Nakai in Bot. Mag. Tokyo 44: 526. 1930.

灌木, 高 1—2 米; 枝红褐色或褐色, 被柔毛和腺毛, 疏生皮刺。小叶 3—5 枚, 卵形或宽卵形, 长 3—7 厘米, 宽 2—3.5 厘米, 顶端急尖, 顶生小叶顶端常渐尖, 基部宽楔形至圆形, 两面疏生柔毛, 边缘具不整齐尖锐重锯齿; 叶柄长 2—3 厘米, 顶生小叶柄长约 1 厘米, 稀较长, 均具柔毛和腺毛, 并疏生皮刺; 托叶披针形或卵状披针形, 两面具柔毛。花常单生于侧枝顶端, 也有腋生; 花梗长 (2)3—6 厘米, 具柔毛和腺毛, 或有极少小皮刺; 苞片小, 线形, 具柔毛; 花大, 直径 3—4 厘米; 花萼外密被柔毛和腺毛; 萼片卵状披针形或三角披针形, 顶端长尾尖, 外面边缘被灰白色绒毛, 花后反折; 花瓣倒卵形或近圆形, 白色, 基部具爪; 花丝较宽; 花柱和子房均无毛。果实近球形, 直径 1—2 厘米, 无毛。花期 4 月, 果期 5—6 月。

产河南、江西、安徽、江苏、浙江、福建、台湾、广东。生山坡路旁阴湿处或灌丛中, 海拔达 1500 米。朝鲜、日本也有分布。

全株及根入药, 能消炎解毒、清热镇惊、活血及祛风湿。