

84. 单叶,披针形,无毛;花直径约 1—1.8 厘米;花梗长约 0.5—1 厘米;雌蕊 50—70 或较多(亚组

24. 蒲桃叶亚组 Subject. *Jambosoides* Yü et Lu).....

.....170. 蒲桃叶悬钩子 *R. jambosoides* Hance

亚组 12. 绢毛亚组——Subject. *Lineati* (Focke) Yü et Lu, 植物分类学报 **20**(3):

307.1982. ——Sect. *Lineati* Focke, Bibl. Bot. **72**(1):45. 1910 et **83**:24. 1914.

本亚组有下列 1 种。

86. 绢毛悬钩子 (西藏植物志)

Rubus lineatus Reinw. in Blume, Bijdr. Fl. Nederl. Ind. **17**:1108. 1826; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **2**:333. 1878; Focke, Bibl. Bot. **72**(1):47. 1910; Hand.-Mazz. Sim. Sin. **7**:489. 1933; Hara et Ohashi in Fl. E. Himal. **130**. 1966; Thuan in Fl. Camb. Laos et Vietn. **7**:76. 1968. ——*R. pulcherrimus* Hook. in Icon. Pl. **8**:729. 1848.

86a. 绢毛悬钩子(原变种)

R. lineatus Reinw. var. ***lineatus***

灌木,高 1—2 米,多分枝;枝圆柱形,疏生直立小皮刺,密被平贴银灰色或浅黄灰色绢毛,老时绢毛较疏。掌状复叶具 3—5 小叶,小叶片披针形至倒披针形,长 8—12 厘米,宽 1.5—3.5 厘米,顶端尾状渐尖,基部楔形,上面无毛或仅沿中脉稍有毛,下面密被银灰色或黄灰色平贴绢毛,具 30—50 对平行脉,直达齿尖,边缘有尖锐单齿或重锯齿;叶柄长 2—5 厘米,被绢毛;托叶分离,披针形或卵状长圆形,膜质,长 1.2—2 厘米,不育枝上的托叶较宽大,不分裂,外面被绢毛,里面无毛,脱落。花成顶生伞房状聚伞圆锥花序或成束生于叶腋;总花梗、花梗和花萼外密被银灰色或浅黄灰色绢毛;花梗长约 1 厘米,苞片和托叶相似;花白色,直径约 1.5 厘米;萼片卵状三角形至卵圆披针形,顶端渐尖至长渐尖,常全缘;花瓣椭圆形或倒卵圆形,短于萼片;雄蕊直立,多数;雌蕊多数,子房及花柱基部具毛。果实半球形,红色或黄色;小核果多数,核有明显皱纹。花期 7—8 月,果期 9—10 月。

产云南、西藏。生于海拔 1500—3000 米的山坡或沟谷杂木林中,林缘或被破坏的林下。尼泊尔、锡金、不丹、印度东北部、缅甸、越南北部、马来西亚、印度尼西亚也有分布。

86b. 狭叶绢毛悬钩子(变种)

R. lineatus Reinw. var. ***angustifolius*** Hook. f. Fl. Brit. Ind. **2**:333. 1878 “angustifolia”; Focke, Bibl. Bot. **83**:24. f. 4(91). 1914.

本变种与原变种区别在于叶片较小,狭披针形。

产云南西北部。生杂木林下,海拔 1800—2800 米。

86c. 光秃绢毛悬钩子(变种)

R. lineatus Reinw. var. ***glabrescens*** Yü et Lu, 植物分类学报 **20**(3): 307.1982.

本变种花梗与花萼上的绢毛脱落,仅具稀疏柔毛状毛。