

离生,叶状,草质,卵形或长卵形,长2—3.5厘米,宽1.2—2厘米,顶端渐尖,无毛,边缘有不规则粗锯齿。花常3—5朵簇生或成短总状花序,着生于侧生小枝顶端;总花梗和花梗均无毛;花梗长1—2厘米;苞片与托叶相似,唯稍小;花直径2—3厘米;花萼红褐色,无毛,仅于内萼片边缘具绒毛;萼片宽卵形或三角状卵形,长1.2—2厘米,顶端长尾尖,外萼片边缘自中部以上或顶端浅条裂,内萼片全缘;花瓣椭圆形或匙形,白色,长7—14毫米,宽5—7毫米,无毛,比萼片短,花后直立开展;雄蕊多数,长短不等,长者几与雌蕊近等长,花丝宽扁;雌蕊多数,花柱和子房均无毛。花期5—6月。

产云南(腾冲)。生山坡竹林或山顶杜鹃灌丛中,海拔2800—3000米。

本种具掌状3小叶;托叶离生,叶状,草质,卵形或长卵形,长2—3.5厘米;花3—5朵成束或成短总状花序;花大,直径2—3厘米,在悬钩子属中较为特殊。

亚组15. 梨叶亚组——Subsect. *Pirifolii* (Focke) Yü et Lu, 植物分类学报 **20** (3): 308. 1982. ——Sect. *Pirifolii* Focke, Bibl. Bot. **72**(1):63. 1910 et **83**:27. 1914. p. p.

本亚组有下列1种。

89. 梨叶悬钩子(海南植物志) 太平悬钩子(台湾木本植物志), 蛇泡

Rubus pirifolius Smith, Plant. Icon. Ined. **3**:t. 161. 1791;海南植物志 **2**:196. 1965; Thuan in Fl. Camb. Laos et Vietn. **7**:43. 1968; 中国高等植物图鉴 **2**:264. 图2257. 1972. ——*R. rotundifolius* Reinw. ex Miq. Fl. Ind. Bat. **1**:384. 1855. ——*R. brevipetalus* Elmer, Leaf. Phil. Bot. **2**:450. 1908. ——*R. philippinensis* Focke, apud Elmer in Merr. Leaf. Phil. Bot. **5**:1617. 1913. ——*R. floribundo-paniculatus* Hayata, Icon. Pl. Formos. **3**:89. 1913. ——*R. hexagynus* sensu Merr. in Lingn. Sci. Journ. **5**:87. 1927. non Roxb. 1832. ——*R. parvipetalus* Odashima in Journ. Soc. Trop. Agr. **7**:81. 1935.

89a. 梨叶悬钩子(原变种) 图版15:7—11

R. pirifolius Smith var. **pirifolius**

攀援灌木;枝具柔毛和扁平皮刺。单叶,近革质,卵形、卵状长圆形或椭圆状长圆形,长6—11厘米,宽3.5—5.5厘米,顶端急尖至短渐尖,基部圆形,两面沿叶脉有柔毛,逐渐脱落至近无毛,侧脉5—8对,在下面突起,边缘具不整齐的粗锯齿;叶柄长达1厘米,伏生粗柔毛,有稀疏皮刺;托叶分离,早落、条裂,有柔毛。圆锥花序顶生或生于上部叶腋内;总花梗、花梗和花萼密被灰黄色短柔毛,无刺或有少数小皮刺;花梗长4—12毫米;苞片条裂成3—4枚线状裂片,有柔毛,早落;花直径1—1.5厘米;萼筒浅杯状;萼片卵状披针形或三角状披针形,内外两面均密被短柔毛,顶端2—3条裂或全缘;花瓣小,白色,长3—5毫米,长椭圆形或披针形,短于萼片;雄蕊多数,花丝线形;雌蕊5—10,通常无毛。果实直径1—1.5厘米,由数个小核果组成,带红色,无毛;小核果较大,长5—6毫米,宽3—5毫米,有皱纹。花期4—7月,果期8—10月。