

## 94. 疏松悬钩子(拉汉种子植物名称) 图版 16:7—10

**Rubus laxus** Focke, Bibl. Bot. 72(1): 68. 1910.

攀援灌木；枝具稀疏弯曲小皮刺或近无刺，有绒毛状长柔毛。单叶，长卵形，长7—11厘米，宽4—7厘米，顶端短渐尖，基部心形，上面有疏柔毛，下面柔毛较密，边缘不分裂或3—5浅裂，有不整齐细钝锯齿；叶柄长3—5厘米，有绒毛状长柔毛和稀疏小皮刺；托叶较狭，边缘条裂，裂片线形。顶生花序大而疏松，顶端近总状，花序轴呈之字形弯曲；总花梗、花梗和花萼均被绒毛状长柔毛；花梗长1—2厘米；苞片与托叶相似，边缘或顶端细条裂，具柔毛，早落；花直径约1厘米；萼片卵圆形，顶端急尖或短渐尖，外萼片边缘羽状条裂，内萼片常全缘；花瓣倒卵形至椭圆形，白色，基部微具柔毛；雄蕊下半部有柔毛，花丝线形，雌蕊多数(达40)，子房无毛。花期7—8月。

产云南。生山谷，海拔达1400米。

本种和高粱泡 *R. lambertianus* Ser. 区别在于后者叶片宽卵形，稀长圆状卵形，顶端渐尖；花梗长0.5—1厘米；萼片卵状披针形，全缘；雄蕊15—20。

## 95. 高粱泡(湖北) 蓬藁(经济植物手册),冬牛(浙江),冬菠(福建),刺五泡藤(台湾)

**Rubus lambertianus** Ser. in DC. Prodr. 2:567. 1825; Focke, Bibl. Bot. 72(1):70. 1910; Ohwi, Fl. Jap. 532 1965; 刘业经, 台湾木本植物志 192. 1972; 中国高等植物图鉴 2:262. 图2259. 1972; Liu et Su in Fl. Taiwan 3:116. 1977. ——*R. pycnanthus* Focke in Abh. Naturw. Ver. Bremen 4:196. 1874. ——*R. ochlanthus* Hance in Journ. Bot. 20:260. 1882. ——*R. lambertianus* Ser. var. *xanthoneurus* auct. non Focke 1910: Cheng in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China Bot. ser. 10:144. 1936.

## 95a. 高粱泡(原变种)

**R. lambertianus** Ser. var. ***lambertianus***

半落叶藤状灌木，高达3米；枝幼时有细柔毛或近无毛，有微弯小皮刺。单叶宽卵形，稀长圆状卵形，长5—10(12)厘米，宽4—8厘米，顶端渐尖，基部心形，上面疏生柔毛或沿叶脉有柔毛，下面被疏柔毛，沿叶脉毛较密，中脉上常疏生小皮刺，边缘明显3—5裂或呈波状，有细锯齿；叶柄长2—4(5)厘米，具细柔毛或近于无毛，有稀疏小皮刺；托叶离生，线状深裂，有细柔毛或近无毛，常脱落。圆锥花序顶生，生于枝上部叶腋内的花序常近总状，有时仅数朵花簇生于叶腋；总花梗、花梗和花萼均被细柔毛；花梗长0.5—1厘米；苞片与托叶相似；花直径约8毫米；萼片卵状披针形，顶端渐尖、全缘，外面边缘和内面均被白色短柔毛，仅在内萼片边缘具灰白色绒毛；花瓣倒卵形，白色，无毛，稍短于萼片；雄蕊多数，稍短于花瓣，花丝宽扁；雌蕊约15—20，通常无毛。果实小，近球形，直径约6—8毫米，由多数小核果组成，无毛，熟时红色；核较小，长约2毫米，有明显皱纹。花期7—8月，果期9—11月。

产河南、湖北、湖南、安徽、江西、江苏、浙江、福建、台湾、广东、广西、云南。生低海拔



1—3.尖叶悬钩子 *Rubus acuminatus* Smith: 1.花枝,2.苞片,3.花纵剖面。4—6.独龙悬钩子 *Rubus taronensis* Wu ex Yü et Lu, 4.花枝,5.花纵剖面,6.花瓣。7—10.蓬松悬钩子 *Rubus laxus* Focke: 7.果枝,8.托叶,9.苞片,10.果实。(刘春荣绘)