

本变种叶边分裂较浅,花梗长 1.5—2.5 厘米,花较大。

产云南。生林中,海拔 2800 米。

128. 多毛悬钩子

Rubus lasiotrichos Focke, Bibl. Bot. **72**(1):109. 1910. — *R. rufus* Focke var. *hederifolius* Card. in Lecomte, Not. Syst. **3**:304. 1914. — *R. hederifolius* (Card.) Thuan in Fl. Camb. Laos et Vietn. **7**:69. pl. 5. f. 1. 1968. syn. nov.

攀援灌木;枝圆柱形,棕褐色,具柔毛、软刺毛和钩状皮刺。单叶,心状近圆形,直径 9—14 厘米,上面沿叶脉有长柔毛,下面密被棕褐色绒毛,沿叶脉具棕褐色长硬毛和稀疏钩状小皮刺,边缘 5 裂,分裂较浅或稍深,裂片三角形或三角状披针形,顶生裂片较大,顶端急尖或渐尖,有不整齐尖锐锯齿,基部具掌状 5 出脉;叶柄长 6—8(10) 厘米,被柔毛、棕褐色软刺毛和稀疏钩状小皮刺;托叶离生,褐色,长 1—1.2 厘米,宽不足 1 厘米,顶端梳齿状分裂,分裂较浅,裂片披针形,早落。花团集生于叶腋或成顶生短总状花序,具少数花;总花梗和花梗均密被柔毛、棕褐色软刺毛和疏生小刺;花梗长 0.5—1 厘米;苞片与托叶相似;花直径 1.2—1.7 厘米;花萼外密被棕褐色绒毛和软刺毛;萼片宽卵形,顶端急尖或短突尖,外萼片上半部常条裂,裂片线形,内萼片常全缘;花瓣近圆形或宽椭圆形,白色,基部具短爪,稍短或几与萼片等长;雄蕊多数,花丝线形;雌蕊较多,无毛,花柱稍长于雄蕊。果期近球形,红色,由多数小核果组成,包藏在宿萼内;核具明显细皱纹。花期 7—8 月,果期 10 月。

产四川、云南。生干燥山坡、石山或疏林内,海拔 2000—2700 米。

此种和棕红悬钩子 *R. rufus* Focke 近缘,区别在于后者托叶和苞片宽大,长达 2 厘米,宽达 1.5 厘米,脱落迟,分裂深,裂片线形或线状披针形;花较小,直径约 1 厘米;萼片披针形,顶端尾尖;果较小,由少数小核果组成。

129. 大乌泡(拉汉种子植物名称) 大红黄袍,乌泡

Rubus multibracteatus Lévl. et Vant. in Bull. Acad. Géog. Bot. **11**:99. 1902; Focke, Bibl. Bot. **72**(1): 103. 1910; Card. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris **23**:285. 1917. sub *R. mallodes*; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:496. 1933; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **18**:33. 1937; Thuan in Fl. Camb. Laos et Vietn. **7**:65. 1968; Lauener in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **30**(2): 276. 1970. — *R. andropogon* Lévl. in Fedde. Repert. Sp. Nov. **8**:58. 1910 et Cat. Pl. Yunnan 236. 1917. — *R. clinocephalus* Focke, Bibl. Bot. **72**(1): 102. f. 44. 1910 et **83**:31. 1914; Lévl. Fl. Kouy-Tchéou 357. 1915 et Cat. Pl. Yunnan 236. 1917. — *R. mallodes* Focke, Bibl. Bot. **72**(1):104. f. 45. 1910 et **83**:34. 1914; Craib, Fl. Siam. Enum. **1**:572. 1931. — *R. major* Focke in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **5**:72. pl. 63. 1911 et Bibl. Bot. **83**:34. 1914.

129a. 大乌泡(原变种)