

R. reflexus Ker var. **macrophyllus** Yü et Lu, 植物分类学报 **20**(4): 460. 1982.

本变种叶片大,长 14—20 厘米,宽 12—19 厘米,边缘 5 浅裂,裂片顶端急尖。

产云南(屏边)。生山谷中,海拔 1300 米。

142c. 深裂锈毛莓(变种)

R. reflexus Ker var. **lanceolobus** Metc. in Lingn. Sci. Journ. **11**:7. 1932 “lanceoloba”.

本变种叶片心状宽卵形或近圆形,边缘 5—7 深裂,裂片披针形或长圆披针形。

产湖南、福建、广东、广西。生低海拔的山谷或水沟边疏林中。

143. 攀枝莓(经济植物手册) 少花乌泡(湖北植物志),对嘴泡、老雅泡(贵州),阿格的(贵州雷公山苗语)

Rubus flagelliflorus Focke ex Diels in Engler, Bot. Jahrb. **29**:393. 1901 et Bibl. Bot. **72**(1):111. f. 51. 1910. — *R. flagelliflorus* Hort. Angl. ex Schneid. 111. Handb. Laubh. **2**:964. 1912.

攀援或匍匐小灌木;枝褐色,幼时密被灰白色绒毛,老时脱落,具稀疏钩状小皮刺。单叶,革质,叶片卵形或长卵形,长 7—15 厘米,宽 5—9 厘米,顶端急尖至短渐尖,基部深心形,上面无毛,下面密被黄色绒毛,边缘常不分裂或微波状,有不整齐圆钝锯齿,基部具掌状 5 出脉,侧脉 4—5 对;叶柄长 3—6 厘米,幼时密被灰白色绒毛,老时脱落,疏生钩状小皮刺;托叶离生,棕色,具黄色柔毛,顶端掌状分裂,裂片披针形。花成腋生短总状花序或数朵簇生;总花梗、花梗和花萼密被黄色绒毛状柔毛;花梗长 1—2 厘米;苞片与托叶相似,但较小;花直径约 1 厘米;萼片卵状披针形,顶端渐尖,常全缘,内面紫红色,花后常反折;花瓣小,比萼片短很多,早落,近圆形,白色,近基部微具柔毛;雄蕊多数,无毛,花丝宽;雌蕊很多,稍长于雄蕊,无毛。果实半球形,直径 1—1.3 厘米,熟时黑色,无毛;核较平滑或稍具皱纹。花期 5—6 月,果期 7—8 月。

产陕西、湖北、湖南、福建、四川、贵州。生海拔 900—1500 米的荒山岩壁或山谷坡地杂木林内。

144. 戟叶悬钩子(拉汉种子植物名称) 红绵藤(中山大学科技通讯)

Rubus hastifolius Lévl. et Vant. in Bull. Soc. Bot. Fr. **51**:218. 1904; Lévl. in Bull. Acad. Géog. Bot. **20** (Mem.):28. 1909; Focke, Bibl. Bot. **72**(1):107. 1910 et **83**:35. 1914; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **18**:36. 1937; Thuan in Fl. Camb. Laos et Vietn. **7**:39. 1968. — *Rubus rufo-lanatus* Chang H. T., 中山大学科技通讯 **1**: 8. 1972.

常绿攀援灌木,长达 12 米,主干直径 4—6 厘米;枝圆柱形,灰褐色,长鞭状,枝顶端落地常生不定根,小枝密被灰白色绒毛,老时毛常脱落,疏生短小皮刺。单叶,近革质,长圆披针形或卵状披针形,长 6—12 厘米,宽 2.5—4 厘米,顶端急尖至短渐尖,基部深心形,上面无毛,深绿色,下面密被红棕色绒毛,边缘不分裂或近基部有 2 浅裂片,裂片圆钝