

产广东、广西。生山坡石上阳处林中或山谷疏林中,海拔 900—1500 米。

本种叶片近圆形,下面无毛;花成顶生狭圆锥花序或腋生近总状花序;托叶宽,长圆形,长 2—3 厘米,这些特征易与其他种相区别。

亚组 22. 总序亚组——Subsect. *Sozostyli* (Focke) Yü et Lu, 植物分类学报 **20** (4): 461. 1982. ——Sect. *Sozostyli* Focke, Bibl. Bot. **72**(1):42. 1910 et **83**:22. 1914.

本亚组有下列 17 种。

151. **五叶鸡爪茶**(湖北植物志) 五加皮(四川),普莱肥莓(经济植物手册)

Rubus playfairianus Hemsl. (in sched. ex pte. nom. mutat.) ex Focke, Bibl. Bot. **72** (1):45. 1910. ——*R. playfairii* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**:235. 1887. ex pte.

落叶或半常绿攀缘或蔓性灌木;枝暗色,幼时有绒毛,疏生钩状小皮刺。掌状复叶具 3—5 枚小叶,小叶片椭圆披针形或长圆披针形,长 5—12 厘米,宽 1—3 厘米,顶生小叶远较侧生小叶大,顶端渐尖,基部楔形,上面无毛,下面密被平贴灰色或黄灰色绒毛,边缘有不整齐尖锐锯齿,侧生小叶片有时在近基部 2 裂;叶柄长 2—4 厘米,被绒毛状柔毛,疏生钩状小皮刺,顶生小叶有极短柄,侧生小叶几无柄;托叶离生,长达 1 厘米,长圆形,掌状深裂,裂片披针形或线形,脱落。花成顶生或腋生总状花序;总花梗和花梗被灰色或灰黄色绒毛状长柔毛,混生少数小皮刺;花梗长 1—2 厘米;苞片与托叶相似;花直径 1—1.5 厘米;花萼外密被黄灰色至灰白色绒毛状长柔毛,无腺毛;萼片卵状披针形或三角状披针形,顶端渐尖至尾尖,全缘;花瓣卵圆形,锐尖;雄蕊多数,幼时有柔毛,老时脱落,花丝不膨大;雌蕊约 60,具长柔毛。果实近球形,幼时红色,有长柔毛,老时转变为黑色,由多数小核果组成。花期 4—5 月,果期 6—7 月。

产陕西、湖北、四川、贵州。生山坡路旁、溪边及灌木丛中,海拔 300—1700 米。

根含丹宁,可提取栲胶。

此种和竹叶鸡爪茶 *R. bambusarum* Focke 区别在于后者托叶和苞片全缘或仅顶端有锯齿;小叶片狭披针形或狭椭圆形,边缘有不明显的稀疏小锯齿;雄蕊柔毛老时不脱落。

152. **竹叶鸡爪茶**(湖北植物志) 老林茶(湖北),短柄鸡爪茶(中国树木分类学)

Rubus bambusarum Focke in Hook. Icon. Pl. ser. **3**:10; in nota ad pl. 1952. 1891; Focke, Bibl. Bot. **72**(1):44. 1910. ——*R. henryi* Hemsl. et Ktze. var. *bambusarum* (Focke) Rehd. in Journ. Arn. Arb. **2**:179. 1921; Sealy in Curtis's Bot. Mag. **165**:t. 33. 1948; 中国高等植物图鉴 **2**: 261. 1972.

常绿攀援灌木;枝具微弯小皮刺,幼时被绒毛状柔毛,老时无毛。掌状复叶具 3 或 5 小叶,革质,小叶片狭披针形或狭椭圆形,长 7—13 厘米,宽 1—3 厘米,顶端渐尖,基部宽楔形,上面无毛,下面密被灰白色或黄灰色绒毛,中脉突起而呈棕色,边缘有不明显的稀疏小锯齿;叶柄长 2.5—5.5 厘米,幼时具绒毛,逐渐脱落至无毛,小叶几无柄;托叶早落。花成