

f. Gen. Pl. 1:618. 1865; Focke in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam.

3(3):38. 1888; Juzep. in Bull. Jard. Bot. Princ. URSS 28:306—327.

1929; Hutch. Gen. Flow. Pl. 1: 202. 1964.

矮小常绿半灌木;茎丛生或稍匍匐地面。单叶互生,边缘外卷,全缘至近羽状浅裂,下面白色;托叶贴生于叶柄,宿存。花茎细,直立,仅生1朵两性花,少为杂性花;萼筒短,凹下,有腺毛,萼片6—10,宿存;花瓣(6—)8(—10),白色,有时黄色,倒卵形;雄蕊多数,离生,成2轮;花盘和萼筒结合;心皮多数,离生,花柱顶生,胚珠1个。瘦果多数,顶端有白色羽毛状宿存花柱。染色体基数 $x = 9$ 。

本属的模式种: 仙女木 *Dryas octopetala* L.

本属 3—14 种,分布北半球温带高山及寒带,我国产 1 种。

1. 仙女木(经济植物手册)

Dryas octopetala L. Sp. Pl. 501. 1753.

1a. 仙女木(原变种)

D. octopetala L. var. ***octopetala***

产亚洲、欧洲和北美高山地带。

1b. 东亚仙女木(变种) 多瓣木(中国高等植物图鉴),宽叶仙女木(东北植物检索表)图版 32: 1—5

D. octopetala L. var. ***asiatica*** (Nakai) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 7:47. t. 17. 1918; Kitagawa, Lineam. Fl. Mansh. 259. 1939; 中国高等植物图鉴 2: 284. 图 2298. 1972; 东北草本植物志 5:44. 图版 2. 图 9—11. 1976. ——*D. octopetala* L. f. *asiatica* Nakai in Bot. Mag. Tokyo 30: 233. 1916. ——*D. ajanensis* Juzep. in Bull. Jard. Bot. Princ. URSS 28: 318. 1929 et in Fl. URSS 10: 275. 1941. ——*D. tschonoskii* Juzep. l. c. 319. 1929 et l. c. 276. 1941; 东北植物检索表 140. 图版 41. 图5. 1959. ——*D. nervosa* Juzep. l. c. 320. 1929. ——*D. octopetala* auct. non L. 1753; Kom. in Acta Hort. Petrop. 22:518. 1904; Nakai in Bot. Mag. Tokyo 22:79. 1908.

常绿半灌木,根木质;茎丛生,匍匐,高 3—6 厘米,基部多分枝。叶亚革质,椭圆形、宽椭圆形或近圆形,长 5—20 毫米,宽 3—12 毫米,先端圆钝,基部截形或近心形,边缘外卷,有圆钝锯齿,上面疏生柔毛或无毛,下面有白色绒毛,侧脉 7—10 对,中脉及侧脉在下面隆起,有黄褐色分枝长柔毛;叶柄长 4—20 毫米,有密生白色绒毛及黄褐色分枝长柔毛;托叶膜质,条状披针形,长 4—5 毫米,大部分贴生于叶柄,先端锐尖,全缘,有长柔毛。花茎长 2—3 厘米,果期达 6—7 厘米,有密生白色绒毛、分枝长柔毛及多数腺毛;花直径 1.5—2 厘米,萼筒连萼片长 7—9 毫米,有疏生白色卷毛及多数深紫色分枝柔毛,并杂有深紫色及淡黄色腺毛;萼片卵状披针形,长 5—6 毫米,先端近锐尖,外面有深紫色分枝柔毛及疏生白色柔毛,内面先端有长柔毛;花瓣倒卵形,长 8—10 毫米,白色,先端圆形,无毛;雄蕊多