

2. 小叶下面密被银白色绒毛,上面被稀疏平铺柔毛,边缘不反卷……………
…………… 1c. 白毛金露梅 *P. fruticosa* L. var. *albicans* Rehd. et Wils.
1. 矮小垫状灌木,丛生有较多接近地面纤细茎,无明显的直立茎。……………
…………… 1d. 垫状金露梅 *P. fruticosa* L. var. *pumila* Hook. f.

1b. 伏毛金露梅(变种)

P. fruticosa L. var. *arbuscula* (D. Don) Maxim. in Mém. Biol. 9:158. 1873. —
P. arbuscula D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 256. 1925. — *P. rigida* Wall. ex Lehm. Revis.
Potent. 19. t. 1. 1856. p. p. — *P. lespedeza* Lévl., China Revue Annuelle, 5, 30 & pl.
1916 & in Le monde des Pl. ser. 3, 18:54. 1917. — *P. arbuscula* D. Don var. *rigida*
(Wall.) Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:508. 1933. p. p. — *P. fruticosa* auct. non L. 1753:
Wolf in Bibl. Bot. 71:55. 1908.

本变种与原变种的主要区别在于,小叶片上面密被伏生白色柔毛,下面网脉较为明显突出,被疏柔毛或无毛,边缘常向下反卷。 花果期 7—8 月。

产四川、云南、西藏。生山坡草地、灌丛或林中岩石上,海拔 2600—4600 米。

1c. 白毛金露梅(经济植物手册)

P. fruticosa L. var. *albicans* Rehd. & Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:302. 1916. —
P. fruticosa L. var. *vilmoriniana* Kem. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 7:146. 1909. — *P.*
arbuscula var. *albicans* Rehd. & Wils. in Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:508. 1933. — *P. ar-*
buscula D. Don var. *bulleyana* Balf f. ex H. R. Fletcher in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb.
20:208. 1950.

本变种小叶下面密被银白色绒毛或绢毛,易与原变种相区别。 花果期 6—9 月。

产新疆、四川、云南、西藏。生高山草地、干旱山坡、林缘及灌丛中,海拔 400—4600 米。

1d. 垫状金露梅(变种)

P. fruticosa L. var. *pumila* Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2:348. 1878; Wolf in Bibl.
Bot. 71:59. 1908. p. p. — *P. arbuscula* D. Don var. *pumila* (Hook. f.) Hand.-Mazz.
Symb. Sin. 7:508. 1933.

垫状灌木,密集丛生,高 5—10 厘米。小叶片 5,椭圆形,长 3—5 毫米,宽 3—4 毫米,上面密被伏毛,下面网脉明显,几无毛或被稀疏柔毛,叶边缘反卷;单花顶生,花直径 1—1.5 厘米,几无柄或柄极短,易与其他变种相区别。 花期 6 月。

产西藏。生高山草甸、灌丛中及砾石坡,海拔 4200—5000 米。

2. 银露梅 银老梅(东北木本植物图志),白花棍儿茶(东北)。

Potentilla gabra Lodd. Bot. Cab. 10:t. 914. 1824; Hand.-Mazz. in Acta Hort.
Gothob. 13:295. 1940; H. R. Fletcher in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. 20:211. 1950; 内

蒙古植物志 3: 83. 图版 42. 图 4. 1977.——*P. glabrata* Willd. ex Schlecht. in Mag. Ges. Naturf. Fr. Berl. 7:285. 1816.——*P. fruticosa* L. var. *mongolica* Maxim. in Mém. Biol. 9: 158. 1873.——*P. fruticosa* L. β. *dahurica* Ser. in DC. Prodr. 2: 579. 1825.——*P. fruticosa* L. var. *tangutica* Wolf in Bibl. Bot. 71:57. 1908.——*P. fruticosa* L. var. *dahurica* Lehm. f. *ternata* Card. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 22:398. 1916.——*Dasiphora davurica* (Nestl.) Kom. et Klob.-Alis. Key Pl. Far East. Reg. URSS 2:641. 1932 (quoad nomen); 东北木本植物图志 310. 图版 107. 图 223. 1955.——*P. glabra* Lodd. var. *rhodocalyx* H. R. Fletcher in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. 20:211. 1950.——*P. veitchii* Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:509. 1933. non Wils. 1911.

2a. 银露梅(原变种)

P. glabra Lodd. var. *glabra*

灌木,高 0.3—2 米,稀达 3 米,树皮纵向剥落。小枝灰褐色或紫褐色,被稀疏柔毛。叶为羽状复叶,有小叶 2 对,稀 3 小叶,上面一对小叶基部下延与轴汇合,叶柄被疏柔毛;小叶片椭圆形、倒卵椭圆形或卵状椭圆形,长 0.5—1.2 厘米,宽 0.4—0.8 厘米,顶端圆钝或急尖,基部楔形或几圆形,边缘平坦或微向下反卷,全缘,两面绿色,被疏柔毛或几无毛;托叶薄膜质,外被疏柔毛或脱落几无毛。顶生单花或数朵,花梗细长,被疏柔毛;花直径 1.5—2.5 厘米;萼片卵形,急尖或短渐尖,副萼片披针形、倒卵披针形或卵形,比萼片短或近等长,外面被疏柔毛;花瓣白色,倒卵形,顶端圆钝;花柱近基生,棒状,基部较细,在柱头下缢缩,柱头扩大。瘦果表面被毛。 花果期 6—11 月。

产内蒙古、河北、山西、陕西、甘肃、青海、安徽、湖北、四川、云南。生山坡草地、河谷岩石缝中、灌丛及林中,海拔 1400—4200 米。朝鲜、苏联、蒙古也有分布。

本种有人列为金露梅 *P. fruticosa* L. 的变种,但本种花白色,一般枝叶柔毛较少或几无毛,副萼片顶端多圆钝,常短于萼片,可另立为一种。

功用和药效同于金露梅。

银露梅变种检索表

1. 小叶下面绿色,疏被白色绢毛、疏柔毛或脱落几无毛。
 2. 小叶上面疏生柔毛,花梗被疏柔毛。
 3. 小叶片椭圆形、倒卵椭圆形或卵状椭圆形;花直径 1.5—2.5 厘米,萼片卵形,顶端急尖或渐尖,花瓣倒卵形……………2a. 银露梅 *P. glabra* Lodd. var. *glabra*
 3. 小叶披针形或长圆披针形;花直径较大,2.5—3 厘米,萼片披针形,顶端长渐尖,花瓣匙状倒卵形,基部有长爪……………2b. 长瓣银露梅 *P. glabra* Lodd. var. *longipetala* Yü et Li
 2. 小叶上面伏生白色绢毛,花梗较粗,密被白色绢状柔毛……………2c. 伏毛银露梅 *P. glabra* Lodd. var. *veitchii* (Wils.) Hand.-Mazz.
1. 小叶下面密被白色绒毛或绢毛……………2d. 白毛银露梅 *P. glabra* Lodd. var. *mandchurica* (Maxim.) Hand.-Mazz.