

2.5 厘米;萼片卵形,急尖,副萼片椭圆形,急尖,与萼片近相等;花瓣黄色,倒卵形,顶端圆形,超过萼片 2 倍以上;花柱侧生,小枝状,柱头稍微扩大。瘦果表面光滑或有皱纹。 花果期 7—9 月。

产四川、云南、西藏。生山坡草地及多砾石地,海拔 2700—4500 米。(模式标本采自大理苍山)。

本种与康定委陵菜 *P. tatsienluensis* Wolf 很相近,但后者小叶卵形,通常边缘有 4—7 圆钝锯齿,下面沿脉被疏柔毛,可以区别。

21. 康定委陵菜 图版 40: 5

Potentilla tatsienluensis Wolf in Bibl. Bot. **71**:680. 1908; Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothob. **13**:323. 1939; H. R. Fletcher in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **20**:216. 1950. —*P. stenophylla* (Franch.) Diels var. *emergens* et var. *exaltata* Card. in Lecomte, Not. Syst. **3**:241. 1914. —*P. stenophylla* (Franch.) Diels var. *compacta* J. Krause in Fedde, Repert Sp. Nov. Beih. **7**:410. 1922. —*P. fulgens* auct. non Wall. ex Lehm.: Diels in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **7**:16. 1912

多年生草本。根粗大,圆柱形,花茎直立或上升,高 5—40 厘米,被伏生疏柔毛。基生叶为羽状复叶,有小叶 10—18 对,间隔 0.2—0.3 厘米,连叶柄长 3—20 厘米,叶柄被伏生疏柔毛;小叶片对生或互生,无柄,卵形或椭圆形,长 0.3—1.3 厘米,宽 0.3—0.8 厘米,向基部逐渐缩小成附片状,顶端圆形或截形,基部圆钝或微心形,通常边缘有 5—7 圆钝锯齿,稀齿急尖,常在基部 1/3 以下全缘,上面绿色,被疏柔毛,有时脱落,下面被疏柔毛,沿中脉较密;茎生叶无或 1—2,有小叶 3—8 对;基生叶托叶褐色,膜质,外被疏长柔毛,稀脱落几无毛;茎生叶托叶膜质或草质,全绿,有齿或深裂。伞房状聚伞花序有花 3—7(10)朵,疏散,花梗长 2—4 厘米,被伏生柔毛;花直径 2.5—3.5 厘米;萼片三角卵形,顶端急尖,副萼片椭圆形或椭圆卵形,顶端急尖,比萼片稍短或近等长;花瓣黄色,顶端圆钝,超过萼片长约两倍;花柱侧生,小枝状,柱头扩大。瘦果光滑。 花果期 6—8 月。

产四川、云南、西藏。生高山草原、沼泽地或林边,海拔 3600—4200 米。


本种有些植物生长在 4000 米高山上,比较矮小,外形与小叶委陵菜 *P. microphylla* D. Don 相似,但后者单花极稀 2 花,小叶分裂较深,达叶片中部或过之,裂片狭窄成带形,不易混淆。

系 7. 小叶系——Ser. Microphyllae Yü et Li, 植物分类学报 **18**(1): 5. 1980.

本系有下列 4 种。

22. 小叶委陵菜

Potentilla microphylla D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 231. 1825; Lehm. Monogr. Potent. Suppl. **1**:5. ic. t. 2. f. 2. 1835; Wolf in Bibl. Bot. **71**: 681. 1908.



1-2. 间断委陵菜 *Potentilla interrupta* Yü et Li: 1. 植株, 2. 子房及花柱。3-4. 总梗委陵菜 *Potentilla peduncularis* D. Don: 3. 基生叶, 4. 子房及花柱。5. 康定委陵菜 *Potentilla tatsienluensis* Wolf: 5. 基生叶。6. 狭叶委陵菜 *Potentilla stenophylla* (Fr.) Diels: 6. 基生叶。(王金凤绘)