

P. multifida L. var. **nubigena** Wolf in Bibl. Bot. **71**:155. 1908. — *P. multifida* L. a. *minor* Ldb. Fl. Ross. **2**: 43. 1844.

植株极为矮小,花茎接近地面铺散,长3—8厘米,花朵较少,基生叶有小叶(2—)3对,连叶柄长2.5—4厘米,小叶裂片呈舌状带形,上面密被伏生柔毛,下面密被绒毛及长绢毛。 花果期5—7月。

产内蒙古、河北、陕西、甘肃、青海、新疆、西藏。生高山河谷阶地、山坡草地,海拔1300—5000米。伊朗、苏联中亚地区及阿尔泰山地区也有分布。

31. 多茎委陵菜(中国高等植物图鉴) 猫爪子(陕西)

Potentilla multicaulis Bge. in Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. **2**:99. 1833; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:513. 1933, et in Acta Hort. Gothob. **13**:305. 1939; 中国高等植物图鉴 **2**: 291. 图 2311. 1972; 东北草本植物志 **5**: 27. 图版 6. 图 1—3. 1976. — *P. sericea* L. var. *multicaulis* Lehm. Revis. Potent. **34**. 1856. — *P. pensylvanica* auct. non L.: Forbes & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**:243. 1887. — *P. soongarica* auct. non Bge.: Wolf in Bibl. Bot. **71**: 159. 1908. p. p. — *P. sericea* auct. non L. 东北植物检索表 148. 图版 43. 图 6. 1959.

多年生草本。根粗壮,圆柱形。花茎多而密集丛生,上升或铺散,长7—35厘米,常带暗红色,被白色长柔毛或短柔毛。基生叶为羽状复叶,有小叶4—6对稀达8对,间隔0.3—0.8厘米,连叶柄长3—10厘米,叶柄暗红色,被白色长柔毛,小叶片对生稀互生,无柄,椭圆形至倒卵形,上部小叶远比下部小叶大,长0.5—2厘米,宽0.3—0.8厘米,边缘羽状深裂,裂片带形,排列较为整齐,顶端舌状,边缘平坦,或略微反卷,上面绿色,主脉侧脉微下陷,被稀疏伏生柔毛,稀脱落几无毛,下面被白色绒毛,脉上疏生白色长柔毛,茎生叶与基生叶形状相似,惟小叶对数较少;基生叶托叶膜质,棕褐色,外面被白色长柔毛;茎生叶托叶草质,绿色,全缘,卵形,顶端渐尖。聚伞花序多花,初开时密集,花后疏散;花直径0.8—1厘米,稀达1.3厘米;萼片三角卵形,顶端急尖,副萼片狭披针形,顶端圆钝,比萼片短约一半;花瓣黄色,倒卵形或近圆形,顶端微凹,比萼片稍长或长达1倍;花柱近顶生,圆柱形,基部膨大。瘦果卵球形有皱纹。 花果期4—9月。

产辽宁、内蒙古、河北、河南、山西、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、四川。生耕地边、沟谷阴处、向阳砾石山坡、草地及疏林下,海拔200—3800米。

本种与多裂委陵菜 *P. multifida* L. 形态相似,惟本种基生叶小叶对数较多(4—8),下面边缘平坦稀略微反卷;花朵较小,直径0.8—1厘米,副萼片狭窄细小,显著比萼片短而狭;茎生叶托叶常全缘;而多裂委陵菜小叶对数较少(3—5),下面边缘多反卷,茎生叶托叶多分裂或有锯齿极稀全缘;花朵较大,直径1.2—1.5厘米,副萼片宽阔,与萼片近等长或稍短,二者可以区别。

32. 高原委陵菜