

形,顶端圆钝,比萼片稍短,稀近等长;花瓣黄色,倒卵形,顶端微凹,比萼片稍长;花柱近顶生,花柱基部膨大。瘦果长圆卵形,褐色,有皱纹。 花果期5—9月。

产黑龙江、吉林、内蒙古、甘肃、青海、新疆、西藏。生山坡草地、砂地、草原、河漫滩及林缘,海拔600—4100米。苏联、蒙古也有分布。

本种植株较矮小,叶柄,花茎被白色绢毛,小叶片呈篦齿状深裂,裂片窄小,边缘向下反卷,下面绒毛上为一层白色绢毛所覆盖,可与其近缘种相区别。

35b. 变叶绢毛委陵菜(变种)

***P. sericea* L. var. *polyschista* Lehm. Revis. Potent. 34. 1856. — *P. polyschista* Boiss. Diagn. Pl. Or. Nov. ser. 1. 10:6. 1849.**

基生叶只有小叶2对,叶片接近,叶边不反卷,下面密被白色绒毛,沿脉密生绢毛;茎生叶1—2,具3小叶或单叶有深裂片;托叶有齿或全缘,密被柔毛。

产我国西藏。生高山草甸及山坡石缝中,海拔4400—5200米。分布喜马拉雅西北部至克什米尔地区。

36. 西山委陵菜(中国高等植物图鉴)

***Potentilla sischanensis* Bge. ex Lehm. Nov. Stirp. Pugill. 9:3. 1851; Lehm. Revis. Potent. 33. t. 9. 1856; 秦岭植物志 1(2): 555. 1974; 中国高等植物图鉴 2: 292. 图 2313. 1972; 内蒙古植物志 3: 101. 图版 52. 1977. — *P. soongarica* Bge. var. *chinensis* Bge. Enum. Pl. Chin. Bor. Coll. 25. 1931.**

36a. 西山委陵菜(原变种)

P. sischanensis* Bge. ex Lehm. var. *sischanensis

多年生草本。根粗壮,圆柱形,木质化。花茎丛生,直立或上升,高10—30厘米,被白色绒毛及稀疏长柔毛,老时脱落。基生叶为羽状复叶,亚革质,有小叶3—5对,稀达8对,间隔0.5—1.8厘米,连叶柄长3—25厘米,稀达30厘米,叶柄被白色绒毛及稀疏长柔毛;小叶对生稀下部小叶互生,卵形,长椭圆形或披针形,长0.5—3厘米,宽0.4—1.5厘米,边缘羽状深裂几达中脉,基部小叶小,掌状或近掌状,分裂,裂片长椭圆形,披针形或卵状披针形,顶端圆钝或急尖,上面绿色,被稀疏长柔毛,下面密被白色绒毛,边缘平坦或稍微反卷,沿脉伏生白色长柔毛及绒毛;茎生叶无或极不发达,呈苞叶状,掌状或羽状3—5全裂;基生叶托叶膜质,褐色,外面被白色长柔毛,茎生叶托叶亚革质,绿色,卵披针形,下面密被白色绒毛。聚伞花序疏生,花梗长1—1.5厘米,有对生小形苞片,外被稀疏柔毛;花直径0.8—1厘米;萼片卵状披针形或三角状卵形,顶端渐尖,副萼片狭窄,披针形,比萼片短或几等长,外面被白色绒毛和稀疏长柔毛;花瓣黄色,倒卵形,顶端圆钝或微凹,比萼片长0.5—1倍;花柱近顶生,基部稍微膨大,柱头稍扩大。瘦果卵圆形,成熟后有皱纹。 花果期4—8月。

产内蒙古、河北、山西、陕西、宁夏、甘肃、青海。生干旱山坡、黄土丘陵、草地及灌丛