

38. 下江委陵菜 浮尸草(四川)

Potentilla limprichtii J. Krause in Fedde, Repert. Sp. Nov. Beih. 12:408. 1922; Vidal in Fl. Camb. Laos et Vietn. 6:120. 1968. — *P. poterioides* auct. non Willd. ex Schlecht. 1816; Franch. Pl. Delav. 213. 1890. nom. illegit.

多年生草本。根肥厚，圆柱形。花茎纤弱，基部弯曲上升，稀铺散，高 15—30 厘米，被疏柔毛及稀疏绵毛，下部常脱落几无毛。基生叶羽状复叶，有小叶片 4—8 对，间隔 1—2.5 厘米，连叶柄长 6—20 厘米，叶柄被疏柔毛及少数白色绵毛，常脱落几无毛；小叶片对生稀互生，纸质，有短柄或几无柄，卵形，椭圆卵形或长圆倒卵形，长 1—2.5 厘米，宽 0.5—1.5 厘米，前部有 4—7 个齿牙状裂片或锯齿，基部楔形或阔楔形，最下部小叶仅有 2—3 个齿牙状裂片，两面绿色，上面伏生疏柔毛或脱落几无毛，下面被灰白色绵毛及疏柔毛；茎生叶为掌状 3 小叶，小叶形状与基生叶小叶上部小叶相似；基生叶托叶膜质，淡褐色，外被疏柔毛，常脱落几无毛，茎生叶托叶纸质，绿色，卵形，全缘。花序疏散，数朵，花梗纤细，长 3—4 厘米，被疏柔毛或绵毛；花直径 1—1.5 厘米；萼片三角卵形，顶端渐尖或急尖，副萼片带状披针形或椭圆披针形，比萼片短稀近等长，外面被疏柔毛及白色绵毛；花瓣黄色，倒卵形，顶端微凹，比萼片长 0.5—1 倍；花柱近顶生，基部微扩大，柱头头状。瘦果光滑。花果期 10 月。

产四川、湖北、江西、广东。生河边沟边石缝中，模式标本采自四川万县。越南也有分布。

本种植物最初曾由 Franchet 命名为 *P. poterioides* Franch. 该种加词早在 1816 年，Willd. 曾使用过，故在这里不能采用。

Cardot 曾发表 *P. poterioides* Franch. var. *minor* Card. in Lecomte, Not. Syst. 3: 235. 1914.，其特点在于，植株小而纤细，花瓣正圆形，顶端不下凹，模式标本采自湖北西部，我们未见到该类型标本。

Wolf 将本种列入羽叶系 *Ser. Tanacetifoliae*，由于叶柄及叶片下面常被绵毛，列入本系更较适宜。

39. 委陵菜(救荒本草) 一白草、生血丹、扑地虎、五虎擒血、天青地白(陕西)，萎陵菜(东北植物检索表)

Potentilla chinensis Ser. in DC. Prodr. 2:581. 1825; Wolf in Bibl. Bot. 71: 179. 1908; 东北植物检索表 150. 图版 44. 图 1. 1959; 中国高等植物图鉴 2: 292. 图 2314. 1972; 秦岭植物志 1(2): 555. 图 463. 1974; 东北草本植物志 5: 27. 图版 13. 图 1—4. 1976. — *P. exaltata* Bge. in Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. 2:98. 1831. — *P. chinensis* Ser. subsp. *trigonodonta* Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:512. 1933. — *P. chinensis* Ser. var. *xerogens* Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:512. 1933.

39a. 委陵菜(原变种)