

图版 11. 图 4—5. 1976. — *P. formosana* Hance in Ann. Sci. Nat. Bot. Ser. 5. 5:212. 1866. — *P. discolor* Bge. var. *formosana* Franch. Pl. Delav. 212. 1890.

多年生草本。根粗壮，下部常肥厚呈纺锤形。花茎直立，上升或微铺散，高 10—45 厘米，密被白色绵毛。基生叶有小叶 2—4 对，间隔 0.8—1.5 厘米，连叶柄长 4—20 厘米，叶柄密被白色绵毛，有时并有长柔毛；小叶对生或互生，无柄，小叶片长圆形或长圆披针形，长 1—5 厘米，宽 0.5—0.8 厘米，顶端圆钝，稀急尖，基部楔形、宽楔形或偏斜圆形，边缘具圆钝锯齿，稀急尖，上面暗绿色，被稀疏白色绵毛或脱落几无毛，下面密被白色或灰白色绵毛，脉不显或微显，茎生叶 1—2，有掌状 3—5 小叶；基生叶托叶膜质，褐色，外面被白色长柔毛，茎生叶托叶草质，绿色，卵形或宽卵形，边缘常有缺刻状牙齿，稀全缘，下面密被白色绵毛。聚伞花序有花数朵至多朵，疏散，花梗长 1—2.5 厘米，外被绵毛；花直径 1—2 厘米；萼片三角状卵形，副萼片披针形，比萼片短，外面被白色绵毛；花瓣黄色，倒卵形，顶端微凹或圆钝，比萼片长；花柱近顶生，基部具乳头状膨大，柱头稍微扩大。瘦果近肾形，宽约 1 毫米，光滑。 花果期 5—9 月。

产黑龙江、辽宁、内蒙古、河北、山西、陕西、山东、河南、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、四川、福建、台湾、广东。生荒地、山谷、沟边、山坡草地、草甸及疏林下，海拔 100—1850 米。日本、朝鲜也有分布。

全草入药，能解热、消肿、止痢、止血。块根含丰富淀粉，嫩苗可食。

43. 华西委陵菜(秦岭植物志)

Potentilla potaninii Wolf in Bibl. Bot. 71:166. 1908. p. p. 秦岭植物志 2: 554. 1974. — *P. saundersiana* Royle var. *potaninii* (Wolf) Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothob. 13: 314. 1939. p. p. — *P. saundersiana* auct. non Royle 1839: Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothob. 13:312. 1939. p. p.

43a. 华西委陵菜(原变种) 图版 44: 1—4

P. potaninii Wolf var. *potaninii*

多年生草本。根常分枝，花茎丛生，直立或上升，高 10—30 厘米，被白色绒毛及疏柔毛。基生叶羽状复叶，有小叶 2—3 对，间隔 0.3—0.5 厘米，连叶柄长 2—10 厘米，叶柄被白色绒毛及疏柔毛，小叶对生，无柄或几无柄；小叶片倒卵形或倒卵状椭圆形，长 0.5—2.5 厘米，宽 0.3—1.5 厘米，顶端圆钝，基部楔形，边缘具长圆形锯齿，顶端圆钝或急尖，上面绿色，被伏生柔毛，下面被白色绒毛，沿脉伏生长柔毛，茎生叶羽状 5 小叶或掌状 3 小叶；基生叶托叶膜质，褐色，外被柔毛，茎生叶托叶绿色，草质，披针形或卵状披针形，顶端渐尖，边缘全缘，下面被白色绒毛及疏柔毛。聚伞花序疏散，有花多朵，花梗长 1.5—2.5 厘米，外被白色绒毛；花直径 1—1.5 厘米；萼片卵状披针形或长卵形，顶端渐尖，副萼片披针形或长椭圆披针形，与萼片近等长稀稍短，外面被疏柔毛；花瓣黄色，倒卵形，顶端微凹，比萼片长 0.5—1 倍；花柱近顶生，基部微膨大，柱头扩大。瘦果光滑。 花果期 6—8 月。