

产甘肃、青海、四川、云南、西藏。生山坡草地、林缘、沼地或林下，海拔 1700—3000 米。

本种基生叶有小叶 2—3 对，其中有 2 对小叶间距较远，与钉柱委陵菜 *P. saundersiana* Royle 相似，其界限主要在于前者为明显羽状复叶，而后者常为掌状复叶，有时边缘两个小叶稍往下生，近于掌状。

43b. 裂叶华西委陵菜(变种)

P. potaninii Wolf var. ***compsohylla*** (Hand.-Mazz.) Yü et Li, stat. nov. — *P. compsohylla* Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothob. **13**:306. 1939.

小叶边缘锯齿分裂较深，裂成篦齿状裂片，裂片呈舌状带形。 花果期 6—9 月。

产四川、西藏(阿里)。生山坡草地，海拔 3300—4700 米。

44. 柔毛委陵菜 红地榆(四川)

Potentilla griffithii Hook. f. Fl. Brit. Ind. **2**:351. 1878; Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothob. **13**:315. 1939; H. R. Fletcher in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **20**:212. 1950. — *P. leschenaultiana* Ser. var. *reticulata* Franch. Pl. Delav. 212. 1890 et var. *pumila* Franch. l. c. — *P. sichimensis* Wolf in Bibl. Bot. **71**:169. 1908. — *P. potaninii* Wolf in Bibl. Bot. **71**:166. 1908, p.p. — *P. leschenaultiana* auct. non Ser. 1825: Franch. Pl. Delav. 212. 1890; Wolf in Bibl. Bot. **71**:167. 1908, p.p.; Diels in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **7**:235. 1912. — *P. kleiniana* auct. non Wight & Arn. 1834: Diels in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **7**:234. 1912.

44a. 柔毛委陵菜(原变种) 图版 44: 5—6

P. griffithii Hook. f. var. ***griffithii***

多年生草本。根粗壮，圆柱形，有时多分枝。花茎直立或上升，高 10—60 厘米，被开展长柔毛及短柔毛。基生叶羽状复叶，有小叶 2—3(—4) 对，间隔 0.8—1.2 厘米，连叶柄长 3—10 厘米，叶柄被开展长柔毛及短柔毛；小叶片通常对生，稀下部小叶互生，无柄或几无柄，椭圆形或倒卵状椭圆形，长 0.5—3 厘米，宽 0.5—1.5 厘米，顶端圆钝，稀急尖，基部楔形或宽楔形，边缘有缺刻状锯齿，齿圆钝或急尖，上面绿色，被伏生疏柔毛，下面被白色绒毛及柔毛，沿脉密生长柔毛，有时白色绒毛脱落；茎生叶有羽状 5 小叶或掌状 3 小叶，小叶形状与基生叶小叶相似；基生叶托叶膜质，褐色，外面被长柔毛或脱落几无毛，茎生叶托叶草质，绿色，边缘齿牙状分裂或全缘。花序呈聚伞状伞房花序，少花，疏散；花直径 1.5—2.5 厘米；萼片三角卵圆形，顶端渐尖或急尖，副萼片披针形、长圆披针形或长椭圆形，比萼片短或近等长，外面绿色，被疏柔毛或有时被白色绒毛；花瓣黄色，稀白色，倒卵形，顶端下凹，比萼片长 1—2 倍；花柱近顶生，圆锥形，基部膨大，柱头小，不扩大，瘦果光滑。 花果期 5—10 月。

产四川、贵州、云南、西藏。生荒地、山坡草地、林缘及林下，海拔 2000—3600 米。不