

部膨大,柱头略为扩大。瘦果有脉纹。 花果期 5—6 月。

产黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北。生山坡草地及岩石缝间,海拔 700—1600 米。苏联、蒙古也有分布。

48. 钉柱委陵菜(中国高等植物图鉴)

Potentilla saundersiana Royle, Ill. Bot. Himal. Mount. 2:207. t. 41. 1839, Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothob. 13:312. 1939; 中国高等植物图鉴 2: 293. 图 2316. 1972. ———*P. multifida* L. var. *saundersiana* Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 345. 1878. ———*P. leschenaultiana* Ser. var. *pumila* Franch. Pl. Delav. 212. 1890. ———*P. potaninii* Wolf var. *subdigitata* Wolf in Bibl. Bot. 71:167. 1908. ———*P. tibetica* Card. in Lecomte, Not. Syst. 3:233. 1914. ———*P. griffithii* Hook. f. var. *pumila* (Franch.) Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:511. 1933.

48a. 钉柱委陵菜(原变种)

P. saundersiana Royle var. **saundersiana**

多年生草本。根粗壮,圆柱形。花茎直立或上升,高 10—20 厘米,被白色绒毛及疏柔毛。基生叶 3—5 掌状复叶,连叶柄长 2—5 厘米,被白色绒毛及疏柔毛,小叶无柄;小叶片长圆倒卵形,长 0.5—2 厘米,宽 0.4—1 厘米,顶端圆钝或急尖,基部楔形,边缘有少数缺刻状锯齿,齿顶端急尖或微钝,上面绿色,伏生稀疏柔毛,下面密被白色绒毛,沿脉伏生疏柔毛,茎生叶 1—2,小叶 3—5,与基生叶小叶相似;基生叶托叶膜质,褐色,外面被白色长柔毛或脱落几无毛,茎生叶托叶草质,绿色,卵形或卵状披针形,通常全缘,顶端渐尖或急尖,下面被白色绒毛及疏柔毛。聚伞花序顶生,有花多朵,疏散,花梗长 1—3 厘米,外被白色绒毛;花直径 1—1.4 厘米;萼片三角卵形或三角披针形,副萼片披针形,顶端尖锐,比萼片短或几等长,外被白色绒毛及柔毛;花瓣黄色,倒卵形,顶端下凹,比萼片略长或长 1 倍;花柱近顶生,基部膨大不明显,柱头略扩大。瘦果光滑。 花果期 6—8 月。

产山西、陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海、四川、云南、西藏。生山坡草地、多石山顶、高山灌丛及草甸,海拔 2600—5150 米。印度、尼泊尔、不丹和锡金也有分布。

本种广布于我国北部及西南部高山地区,植株高矮,毛茸多少均有变异,掌状复叶以 5 小叶为多,也有 3 小叶,有时最下两小叶稍有间隔成亚羽状,叶边锯齿或深或浅,有的成裂片状变异较大。

钉柱委陵菜变种检索表

1. 花多朵成聚伞花序。

2. 基生叶 3—5 掌状复叶。

3. 小叶上面绿色,伏生疏柔毛;副萼片顶端尖锐,比萼片短或几与萼片近等长……………

…………… 48a. 钉柱委陵菜 var. **saundersiana**

3. 小叶上面灰绿色,密被伏生绢状柔毛;副萼片顶端有 2—3 裂齿,稀 4—5 裂齿,与萼片近等长……