

53a. 银光委陵菜(原变种)

P. argyrophylla Wall. var. **argyrophylla**

多年生草本。根茎圆柱形,被棕紫色鳞片。花茎直立或基部稍弯曲,高 15—20 厘米,密被银白色绒毛及长柔毛。基生叶掌状 3 出复叶,连叶柄长 5—10 厘米,叶柄被银白色绒毛及长柔毛;小叶无柄或顶生小叶具极短柄,小叶片倒卵形,椭圆形或广卵形,长 1.5—2 厘米,宽 1—1.5 厘米,顶端圆钝,基部楔形或宽楔形,边缘具缺刻状急尖锯齿,上面伏生银白色绢毛,下面密被银白色绒毛,脉上有伏生银白色绢毛,茎生叶 2—3,叶片较小,叶柄较短;基生叶托叶膜质,褐色,外面伏生白色绢毛,以后脱落,茎生叶托叶绿色,草质,卵形或卵状披针形,全缘,顶端渐尖,下面被绒毛及长柔毛。花顶生 2—3 朵,花梗长 2—2.5 厘米,外被绒毛及长柔毛,花直径约 2 厘米;萼片三角状披针形,顶端渐尖,副萼片椭圆卵形或椭圆披针形,与萼片近等长,外面被伏生白色绢毛;花瓣黄色,倒心形,顶端明显下凹,比萼片长 1 倍;雄蕊黄色;花柱近顶生,比子房长约 2.5 倍,柱头微扩大,头状。花期 5 月。

产西藏。生河滩、林下、灌丛边。海拔 3750—4000 米。克什米尔地区、尼泊尔也有分布。

本种与裂萼钉柱委陵菜 *P. saundersiana* Royle var. *jacquemontii* Franch. 相近似,惟小叶通常 3 出,叶片上面被伏生银白色绢毛,下面密被白色绒毛及绢毛,副萼片不分裂,花柱长于子房 2.5 倍,是其特点。

53b. 紫花银光委陵菜(变种)

P. argyrophylla Wall. var. **atrosanguinea** Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2:357. 1878. —
P. atrosanguinea Lodd. Bot. Cab. 8: t. 786. 1824.

花瓣基部,雄蕊及花柱均紫色。

产我国西藏。生水沟边,海拔 4000 米。

系 12. 银背系——Ser. *Argenteae* (Wolf) Yü et Li, grad. nov. —Grege *Argenteae*
Wolf in Bibl. Bot. 71:252. 1908. —Sect. *Argenteae* (Wolf) Juzep. in Fl. URSS 10:142.
1941.

本系我国有下列 4 种。

银背系分种检索表

1. 基生叶小叶片边缘有锯齿,或有 1—4 裂片,花直径 10—20 毫米。
 2. 小叶片边缘有 2—4 不等长带形或齿牙状裂片,边缘反卷,下面密被白色绒毛。
 3. 小叶片边缘每边有 2—4 狭长带形裂片,边缘微向下反卷..... 55. 窄裂委陵菜 *P. angustiloba* Yü et Li
 3. 小叶片边缘上半部有 2—5 大小不等齿牙状裂片,下半部全缘,边缘向下极为反卷 56. 银背委陵菜 *P. argentea* L.