

子植物手册 367. 图 591. 1959; 中国高等植物图鉴 2: 297. 图 2323. 1972; 秦岭植物志 1(2): 552. 图 461. 1974; 东北草本植物志 5: 13. 图版 9. 图 4—7. 1976. — *P. anemonefolia* Lehm. in Ind. Sem. Hort. Bot. Hamb. 9. 1853 et Revis. Potent. 80. t. 30. 1856. — *P. bodinieri* Lévl. in Bull. Soc. Bot. Fr. 55:56. 1908.

一年生、二年生或多年生宿根草本。多须根。花茎上升或匍匐, 常于节处生根并发育出新植株, 长 10—50 厘米, 被疏柔毛或开展长柔毛。基生叶为近于鸟足状 5 小叶, 连叶柄长 3—20 厘米, 叶柄被疏柔毛或开展长柔毛; 小叶几无柄稀有短柄, 小叶片倒卵形或长圆倒卵形, 长 0.5—4 厘米, 宽 0.4—2 厘米, 顶端圆钝, 基部楔形, 边缘有多数急尖或圆钝锯齿, 两面绿色, 被疏柔毛, 有时上面脱落几无毛, 或下面沿脉密被伏生长柔毛, 下部茎生叶有 5 小叶, 上部茎生叶有 3 小叶, 小叶与基生小叶相似, 唯叶柄较短; 基生叶托叶膜质, 淡褐色, 外面被疏柔毛或脱落几无毛, 茎生叶托叶草质, 绿色, 卵形至卵状披针形, 全缘, 稀有 1—2 齿, 顶端急尖或渐尖, 外被稀疏长柔毛。聚伞花序密集枝顶如假伞形, 花梗长 1—1.5 厘米, 密被开展长柔毛, 下有茎生叶如苞片状; 花直径 0.8—1 厘米; 萼片三角卵圆形, 顶端急尖或渐尖, 副萼片披针形或椭圆披针形, 顶端急尖或渐尖, 花时比萼片短, 果时略长或近等长, 外被稀疏长柔毛; 花瓣黄色, 倒卵形, 顶端微凹, 长于萼片; 花柱近顶生, 圆锥形, 基部膨大, 柱头扩大。瘦果近圆形, 一面稍平, 直径约 0.5 毫米, 具皱纹。 花果期 4—9 月。

产辽宁、陕西、山东、河南、安徽、江苏、浙江、湖北、湖南、江西、福建、广东、广西、四川、贵州、云南、西藏。生田边、水旁、草甸及山坡草地, 海拔 400—3000 米。朝鲜、日本、印度、马来西亚及印度尼西亚均有分布。

全草供药用, 有清热、解毒、止咳、化痰之效, 捣烂外敷治疮毒、痛肿及蛇虫咬伤。

本种广泛分布我国南北各省, 生北方干旱地带, 水湿条件较好地区植株多高大直立, 花茎、叶柄和叶片下面密被开展长柔毛, 花序顶生着多花如假伞形, 而生在华南潮湿温暖地区多为匍匐小草, 每节生不定根, 花茎、叶柄及叶片毛多脱落, 聚伞花序着花减少, 成为两个不同的生态变异, 但这种情况在我国南方两个类型很不固定, 很难再加以划分。

66. 朝天委陵菜(中国高等植物图鉴) 伏萎陵菜(东北植物检索表), 仰卧委陵菜(江苏南部种子植物手册)、铺地委陵菜(秦岭植物志), 鸡毛菜(东北)

*Potentilla supina* L. Sp. Pl. 497. 1753; Wolf in Bibl. Bot. 71:389. 1908; 东北植物检索表 152. 图版 46: 图 2. 1959; 中国高等植物图鉴 2: 295. 图 2320. 1972. — *P. paradoxa* Nutt. ex Torr. et Gray, Fl. N. Am. 1:437. 1840; 江苏南部种子植物手册 368. 图 593. 1959; 秦岭植物志 1(2): 550. 图 459. 1974; 东北草本植物志 5: 33. 图版 15: 图 1—2. 1976. — *P. supina* L. var. *paradoxa* (Nutt.) Wolf in Bibl. Bot. 71: 393. 1908; Sojak. in Folia Geobot. & Phytot. (Praha) 4:207. 1969. — *P. supina* L. var. *egibbosa* Wolf in Bibl. Bot. 71:392. 1908. — *P. fauriei* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 2:198. 1909.