

福建、湖南、四川、云南、广西。生地边、沟边、草地、灌丛及疏林下，海拔 350—2400 米。日本、朝鲜、蒙古、苏联西伯利亚等地均有分布。

过去有些植物学者曾根据植株的高矮、叶形大小，毛的多少以及小叶顶端锐钝程度，花瓣顶端下凹与否等特点，分别建立若干变种或种，我们比较分析了我国南北各地该种大量标本，认为上述特点只是该种植物种内变异的幅度，有的特点甚至表现在同一植株上，很难将其划分成若干独立类型。

79. 三叶委陵菜(中国高等植物图鉴) 三张叶(陕西)

Potentilla freyniana Bornm. in Mitt. Thür. Bot. Ver. N. F. **20**:12. 1904; Wolf in Bibl. Bot. **71**:639. 1908; 东北植物检索表 154. 图版 47. 图 1. 1959; 中国高等植物图鉴 **2**: 298. 图 2326. 1972; 秦岭植物志 **1**(2):553. 1974; 东北草本植物志 **5**:18. 图版 7. 图 1—4. 1976. ——*P. fragarioides* L. var. *ternata* Maxim. in Mém. Biol. **9**:159. 1873. p. p. ——*P. sutchuenica* Card. in Lecomte, Not. Syst. **3**:239. 1914. ——*P. ternata* auct. non Koch 1847: Freyn in Oesterr. Bot. Zeitschr. 62. 1902.

79a. 三叶委陵菜(原变种)

P. freyniana Bornm. var. *freyniana*

多年生草本，有纤匍枝或不明显。根分枝多，簇生。花茎纤细，直立或上升，高 8—25 厘米，被平铺或开展疏柔毛。基生叶掌状 3 出复叶，连叶柄长 4—30 厘米，宽 1—4 厘米；小叶片长圆形、卵形或椭圆形，顶端急尖或圆钝，基部楔形或宽楔形，边缘有多数急尖锯齿，两面绿色，疏生平铺柔毛，下面沿脉较密；茎生叶 1—2，小叶与基生叶小叶相似，唯叶柄很短，叶边锯齿减少；基生叶托叶膜质，褐色，外面被稀疏长柔毛，茎生叶托叶草质，绿色，呈缺刻状锐裂，有稀疏长柔毛。伞房状聚伞花序顶生，多花，松散，花梗纤细，长 1—1.5 厘米，外被疏柔毛；花直径 0.8—1 厘米；萼片三角卵形，顶端渐尖，副萼片披针形，顶端渐尖，与萼片近等长，外面被平铺柔毛；花瓣淡黄色，长圆倒卵形，顶端微凹或圆钝；花柱近顶生，上部粗，基部细。成熟瘦果卵球形，直径 0.5—1 毫米，表面有显著脉纹。 花果期 3—6 月。

产黑龙江、吉林、辽宁、河北、山西、山东、陕西、甘肃、湖北、湖南、浙江、江西、福建、四川、贵州、云南。生山坡草地、溪边及疏林下阴湿处，海拔 300—2100 米。苏联、日本和朝鲜也有分布。

根或全草入药，清热解毒，止痛止血，对金黄色葡萄球菌有抑制作用。

79b. 中华三叶委陵菜(变种) 三叶委陵菜(江苏南部种子植物手册)，地蜂子

P. freyniana Bornm. var. *sinica* Migo in Shangh. Sizerk. Iho **14**:310. 1944; 江苏南部种子植物手册 366. 图 558. 1959. ——*P. fragarioides* L. var. *storoniifera* Maxim. f. *trifoliola* Takeda in Kew Bull. **1911**: 256. 1911.

本变种不同于原变种在于茎和叶柄上被开展柔毛较密，小叶两面被开展或微开展柔