

毛,尤其沿脉较密,小叶片菱状卵形或宽卵形,边缘具圆钝锯齿,花茎或纤匍枝上托叶卵圆形且全缘,极稀顶端2裂。 花果期4—5月。

产江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南。 生草丛中及林下阴湿处,海拔600—800米。

80. 曲枝委陵菜 匍枝委陵菜(东北植物检索表), 曲枝委陵菜(东北草本植物志)

Potentilla yokusaiana Makino in Bot. Mag. Tokyo 142. 1910; 东北植物检索表 154. 图版 47. 图 4. 1959; 东北草本植物志 5: 18. 图版 7. 图 5--9. 1976. ——*P. freyniana* Bornm. var. *grandiflora* Wolf in Bibl. Bot. 71:640. 1908.

多年生草本,须根簇生并有匍匐枝。匍匐枝常弯曲成膝状,在节处生根发出新植物。基生叶3出掌状复叶,稀叶柄上有1—2个极小的附片,连叶柄长4—7厘米,叶柄被稀疏开展长柔毛,小叶有短柄或几无柄;小叶片菱状卵形、菱状倒卵形或广椭圆形,长1—3.5厘米,宽1—2厘米,顶端急尖,稀圆钝,边缘有少数卵形条裂状锯齿,间或杂有重锯齿,齿端尖锐,上面绿色,被稀疏开展长柔毛,匍匐枝上叶与基生叶相似,花茎上叶1—2,小叶退化缩小,呈倒卵椭圆形,仅顶端有3—4齿;基生叶托叶膜质,褐色,外面被稀疏长柔毛,匍匐枝上托叶薄膜质,淡褐色,披针形,全缘,花茎上托叶草质,卵形,全缘,极稀顶端有齿,外被稀疏长柔毛。伞房花序顶生,花6—8朵,松散;花直径1.5—2厘米;萼片卵状披针形,顶端渐尖,副萼片披针形,顶端渐尖,与萼片近等长;花瓣黄色,倒卵长圆形,顶端微凹,比萼片长半倍;花柱近顶生,基部细,柱头头状扩大。 花期5月。

产辽宁。生山坡灌丛间及山地林缘。日本和朝鲜有分布。

本种与三叶委陵菜 *P. freyniana* Bornm. 相似,但后者根粗壮,匍匐枝不弯曲呈膝状,或不具匍匐枝,小叶边缘锯齿急尖,两面疏生平铺柔毛,花茎上托叶呈缺刻状锐裂,花直径约1厘米,可以区别。

东北地区民间全草入药,水煮可治痢疾泻肚。

系17. 匍匐系——Ser. *Tormentillae* (Rydb.) Yü et Li, grad. nov. ——Group *Tormentillae* Wolf in Asch. & Gr. Syn. 6. 1904. ampl. et Bibl. Bot. 71:52. 641. 1908. ——Sect. *Tormentillae* (Rydb.) Juzep. in Fl. URSS 10:218. 1941.

本系有下列3种。

81. 匍匐委陵菜(中国高等植物图鉴)

Potentilla reptans L. Sp. Pl. 499. 1753; Wolf in Bibl. Bot. 71:654. 1908.

81a. 匍匐委陵菜(原变种)

P. reptans L. var. *reptans*

多年生匍匐草本。根多分枝,常具纺锤状块根。匍匐枝长20—100厘米,节上生不定根,被稀疏柔毛或脱落几无毛。基生叶为鸟足状5出复叶,连叶柄长7—12厘米,叶柄被疏柔毛或脱落几无毛,小叶有短柄或几无柄;小叶片倒卵形至倒卵圆形,顶端圆钝,基部楔形,边缘有急尖或圆钝锯齿,两面绿色,上面几无毛,下面被疏柔毛;纤匍枝上叶与基生叶