

相似;基生叶托叶膜质,褐色,外面几无毛,匍匐枝上托叶草质,绿色,卵状长圆形或卵状披针形,全缘稀有1—2齿,顶端渐尖或急尖。单花自叶腋生或与叶对生,花梗长6—9厘米,被疏柔毛;花直径1.5—2.2厘米;萼片卵状披针形,顶端急尖,副萼片长椭圆形或椭圆披针形,顶端急尖或圆钝,与萼片近等长,外面被疏柔毛,果时显著增大;花瓣黄色,宽倒卵形,顶端显著下凹,比萼片稍长;花柱近顶生,基部细,柱头扩大。瘦果黄褐色,卵球形,外面被显著点纹。花果期6—8月。

产我国新疆。生田边潮湿处,海拔500—600米。广布于欧洲至苏联西伯利亚和中亚地区,非洲北部也有分布。

81b. **绢毛匍匐委陵菜** 绢毛细蔓委陵菜(秦岭植物志),金金棒、金棒锤、五爪龙(陕西)

P. reptans L. var. **sericophylla** Franch. Pl. David. 1:113. 1884; Card. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 22: 407. 1916; 秦岭植物志 1(2): 549, 图 457. 1974. — *P. hemisleyana* Wolf in Bibl. Bot. 71:667. 1908. — *Fragaria filipendula* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23:239. 1887. — *P. reptans* L. var. *incisa* Franch. Pl. David. 1:113. 1884. — *P. indica* auct. non Anders. 1797: Diels in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. 7:235. 289. 1912.

叶为三出掌状复叶,边缘两个小叶浅裂至深裂,有时混生有不裂者,小叶下面及叶柄伏生绢状柔毛,稀脱落被稀疏柔毛。 花果期4—9月。

产内蒙古、河北、山西、陕西、甘肃、河南、山东、江苏、浙江、四川、云南。生山坡草地、渠旁、溪边灌丛中及林缘,海拔300—3500米。

块根供药用,能收敛解毒,生津止渴,也作利尿剂。全草入药,有发表、止咳作用;鲜品捣烂外敷,可治疮疖。

82. **等齿委陵菜**(内蒙古植物志)

Potentilla simulatrix Wolf in Bibl. Bot. 71:663. 1908; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 517. 1933, et in Acta Hort. Gothob. 13:320. 1939; 内蒙古植物志 3: 87. 图版 43. 图 1—6. 1977.

多年生匍匐草本。根细,多分枝。匍匐枝纤细,常在节上生根,长15—30厘米,被短柔毛及长柔毛;基生叶为三出掌状复叶,连叶柄长3—10厘米,叶柄被短柔毛及长柔毛,小叶几无柄。单花自叶腋生,花梗纤细,长1.5—3厘米,被短柔毛及疏柔毛;花直径0.7—1厘米;萼片卵状披针形,顶端急尖,副萼片长椭圆形,顶端急尖,几与萼片等长稀略长,外被疏柔毛;花瓣黄色,倒卵形,顶端微凹或圆钝,比萼片长;花柱近顶生,基部细,柱头扩大。瘦果有不明显脉纹。 花果期4—10月。

产内蒙古、河北、山西、陕西、甘肃、青海、四川。生林下溪边阴湿处,海拔300—2200米。

本种与绢毛匍匐委陵菜 *P. reptans* L. var. *sericophylla* Franch. 相似,不同在于后者边缘两个小叶2浅裂至2深裂,小叶下面常伏生绢状柔毛,花直径较大,直径1.5—2厘米,可以