

产吉林、新疆。生湖畔草原或干旱山坡，海拔2400—2600米。广布北温带至北极圈附近。

1b. 隐瓣山莓草(变种) 隐瓣山金梅(秦岭植物志)

S. procumbens L. var. **aphanopetala** (Hand.-Mazz.) Yü et Li, grad. nov. — *S. aphanopetala* Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothob. **13**:327. 1939; 秦岭植物志 **1**(2): 559. 图 466. 1974. — *S. parviflora* auct. non Willd. 1799: Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothob. **13**:327. 1939; H. R. Fletcher in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **20**:217. 1950 p. p.

本变种与原变种区别在于，植株生长旺盛，高可达30厘米，全身被糙伏毛，茎生叶1—2，副萼片狭长，披针形，与萼片近等长或稍短，但不短于一半，花瓣比萼片短1—4倍，可以区别。 花果期7—8月。

产陕西、甘肃、青海、四川、云南、西藏。生山坡草地、岩石缝及林下，海拔2500—4000米。(模式标本采自四川康定榆林宫)

全草入药、止咳，调经，祛瘀消肿。

2. 楔叶山莓草

Sibbaldia cuneata Hornem. ex Ktze. in Linnæa **20**:59. 1874; Hara et Ohashi in Fl. E. Himal. **132**. 1966. — *S. taiwanensis* Li in Lloydia **14**:236. 1951. — *Potentilla sibbaldi* auct. non Haller f. 1818: Hook. f. Brit. Ind. **2**:345. 1878. — *S. parviflora* auct. non Willd. 1799: Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:519. 1933; Chatterjee in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **19**:326. 1938. p. p.; Kitamura in Fa. & Fl. Nepal Himal. **160**. 1952-53; H. R. Fletcher in Not. Roy. Bot. Edinb. **20**:217. 1950. p. p. — *S. procumbens* auct. non L. 1753; Hayata, Icon. Pl. Formos. **1**:238. 1911.

多年生草本。根茎粗壮，匍匐，圆柱形。花茎直立或上升，高5—14厘米，被伏生或斜展疏柔毛。基生叶为3出复叶，连叶柄长1.5—10厘米，叶柄被伏生疏柔毛，小叶常有短柄或几无柄，广倒卵形至广椭圆形，长0.8—2.5厘米，宽0.6—1.8厘米，顶端截形，通常有3—5卵形急尖或圆钝锯齿，基部阔楔形，两面绿色，散生疏柔毛；茎生叶1—2，与基生叶相似，唯小叶片较小；茎生叶托叶膜质，褐色，外面疏被糙伏毛，茎生叶托叶草质，绿色，披针形，渐尖。伞房状花序密集顶生，花直径5—7毫米；萼片卵形或长圆形，顶端急尖，副萼片披针形，顶端渐尖，与萼片近等长，外面被疏柔毛；花瓣黄色，倒卵形，顶端圆钝，与萼片近等长或稍长；雄蕊5枚；花柱侧生。瘦果光滑。 花果期5—10月。

产云南、青海、西藏、台湾。生高山草地、岩石缝中，海拔3400—4500米。苏联、阿富汗和尼泊尔均有分布。

本种叶片形状近似山莓草 *S. procumbens* L.，惟花瓣与萼片近等长或稍长，叶片较宽，是其异点。

3. 四蕊山莓草

Sibbaldia tetrandra Bge. Verzeichn. Alt. Geb. Pflanz. Sep. 25. 1856; Chatterjee in