

呈假伞状,花梗长1—1.5厘米,被开展疏柔毛;花直径5—6毫米;萼片三角卵形,顶端急尖,副萼片长圆披针形,顶端急尖,几与萼片等长或稍短,外面被黄色疏柔毛;花瓣5(—6),暗紫色或紫红色,倒卵形,顶端圆钝,几与萼片等长或稍短;雄蕊5(—6),花丝短;花柱近顶生。瘦果卵球形,紫褐色,无毛。 花果期6—7月。

产云南。生高山草地,海拔3500—4100米。尼泊尔、锡金和缅甸北部也有分布。

8. 紫花山莓草

Sibbaldia purpurea Royle, Ill. Bot. Himal. 208. pl. 40. f. 3. 1835; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **2**:347. 1878; Chatterjee in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **19**:327. 1938.

8a. 紫花山莓草(原变种)

S. purpurea Royle var. **purpurea**

多年生草本。根稍木质化,根茎多分枝,仰卧。花茎上升,高4—10厘米,伏生疏柔毛。基生叶掌状五出复叶,连叶柄长1.5—4厘米,叶柄伏生疏柔毛,小叶无柄或几无柄,倒卵形或倒卵长圆形,长0.5—1厘米,宽0.3—0.6厘米,顶端圆钝,通常有2—3齿,基部楔形或宽楔形,上下两面伏生白色柔毛或绢状长柔毛;基生叶托叶膜质,深棕褐色,外面疏生绢状柔毛或近无毛。单花1朵,腋生;花直径0.4—0.6厘米;萼片三角状卵形,先端急尖,副萼片披针形,顶端尖,稍短于萼片,外面疏生白毛;花瓣5,紫色,倒卵长圆形,顶端微凹;花盘显著,紫色,雄蕊5,与花瓣互生;花柱侧生。瘦果卵球形,紫褐色,光滑。 花果期6—7月。

产我国西藏。生山坡岩石缝中,海拔4400—4700米。尼泊尔也有分布。

8b. **大瓣紫花山莓草**(变种) 紫花五蕊梅(中国高等植物图鉴),紫花山金梅(秦岭植物志)

S. purpurea Royle var. **macropetala** (Muraj.) Yü et Li, grad. nov. —*S. macropetala* Muraj. in Acta Inst. Bot. Acad. Sci. URSS ser. 1. **2**:235. f. 6. 1936; 中国高等植物图鉴 **2**:302. 图2333. 1972; 秦岭植物志 **1**(2):559. 图467. 1974. —*Potentilla purpurea* auct. non Royle 1835; Franch. Delav. **3**:209. 1890; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:521. 1933.

本变种与原变种区别在于,花序明显成伞房状花序,高出基生叶,稀丛生的个别花茎为单花。

产陕西、四川、云南、西藏。生高山草地、高冷林缘、雪线附近石砾间或岩石缝中,海拔3600—4700米。

9. 五叶山莓草(拉汉种子植物名称) 图版52: 3—5

Sibbaldia pentaphylla J. Krause in Fedde, Repert. Sp. Nov. Beih. **7**:410. 1922; H. R. Fletcher in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **20**:217. 1950.

多年生草本。根茎粗壮,匍匐。花茎丛生、矮小,高2—5厘米。叶为掌状5出复叶,