

期8月。

产云南(贡山)。生高山草地、岩石缝中,海拔3800—4300米。

14. 白叶山莓草

Sibbaldia micropetala (D. Don) Hand.-Mazz. in Karst. & Schenk, Vegetationsbild. 22. Helf. 8:6. 1932; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:520. 1933. — *Potentilla micropetala* D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 231. 1825. — *P. albifolia* Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2:347. 1878. — *P. mairei* Lévl. Cat. Pl. Yunnan 232. 1917. nom. nud.

多年生草本。根粗壮,圆柱形,花茎上升,高10—30厘米,密被白色绒毛,有时脱落被稀疏绒毛。基生叶为羽状复叶,有小叶4—6对,连叶柄长3—5厘米,叶柄被白色绒毛,有时脱落为稀疏柔毛;小叶通常对生,无柄,长椭圆形或倒卵长圆形,长0.5—1厘米,宽0.3—0.8厘米,顶端圆钝,基部楔形、阔楔形或几圆形,边缘有缺刻急尖锯齿,上面灰白色或绿色,被绒毛及柔毛,或仅被疏柔毛,下面被白色绒毛;茎生叶与基生叶相似,惟向上小叶对数逐渐减少,最上面仅3出复叶;基生叶托叶膜质,褐色,外面疏被白色绒毛或脱落几无毛;茎生叶托叶草质,叶状,外面被白色绒毛,内面绿色或暗绿色,边缘有缺刻状锯齿。花自叶腋单出,或有总梗具2—3花,花直径4—8毫米;萼片长卵形,顶端渐尖,副萼片椭圆披针形,顶端尖锐或钝,与萼片近等长或稍短,外面密被白色绒毛;花瓣黄色,长圆披针形,顶端圆钝,等于或短于萼片;雄蕊5数,与萼片互生,花丝极短;花柱侧生。瘦果卵球形,褐色,部分光滑,部分有浅沟纹。 花果期6—8月。

产四川、云南、西藏。生山坡草地及河滩地,海拔2700—4300米。克什米尔地区、不丹和锡金也有分布。

15. 显脉山莓草 图版53: 1—3

Sibbaldia phanerophylebia Yü et Li, 植物分类学报 19(4): 517. 1981.

多年生草本。根细长,多分枝。花茎铺散,长4—10厘米,被淡黄色疏柔毛及白色绒毛。基生叶为羽状复叶,有小叶2—4对,连叶柄长2—5厘米,叶柄被疏柔毛;小叶片有短柄或几无柄,对生,稀互生,椭圆形或倒卵圆形,长0.4—1厘米,宽0.3—0.8厘米,顶端圆钝,基部宽楔形或近圆形,边缘有缺刻状急尖锯齿,上面暗绿色,被疏柔毛,稀被白色绒毛,下面密被白色绒毛,中脉和侧脉明显,散生黄色疏柔毛;茎生叶与基生叶相似,惟上部茎生为3出复叶;基生叶托叶膜质,褐色,外面被疏柔毛或脱落几无毛,茎生叶托叶草质,绿色,卵圆形,边缘有急尖锯齿,外被白色绒毛。花单生于叶腋,在茎上部数朵集生于枝顶;花直径5—6毫米;萼片三角形,顶端急尖,副萼片披针形,渐尖,与萼片近等长,外面被淡黄色柔毛及白色绒毛;花瓣淡黄色,长椭圆形,顶端圆钝,与萼片近等长;雄蕊5枚;花柱侧生。

花期6月。

产云南、西藏。生山坡草地、岩石缝中,海拔3500—3800米。

本种与白叶山莓草 *S. micropetala* (D. Don) Hand.-Mazz. 相近,不同在于花茎和叶