

5 毫米,紫色或红紫色,无毛;雄蕊比花瓣短;心皮 6—10,离生。瘦果长圆形,长 2 毫米,褐色,无毛。 花期夏季,果期秋季。

产内蒙古。生于山坡。蒙古、苏联有分布。

本种和三裂地蔷薇相近,但为成垫状的亚灌木,有长柔毛及短腺毛;基生叶较短,三深裂;花单生或 3—5 朵成简单聚伞花序。

5. 三裂地蔷薇 矮地蔷薇 (东北植物检索表) 图版 54:10

Chamaerhodos trifida Ldb. Fl. Ross. 2:34. 1843; Juzep. in Fl. URSS 10:236. Pl. 17. f. 4. 1941; 东北植物检索表 144. 图版 40. 图 7. 1959; 东北草本植物志 5:40. 图版 15. 图 6—7. 1976; 内蒙古植物志 3: 116. 图版 60. 图 1—5. 1977; Kitagawa, Neo-Lineam. Fl. Mansh. 362. 1979. — *C. klementzii* Muravieva in Bull. Jard. Bot. Princ. URSS. 27: 47. f. 3. 1928. saltem maxim. parte. — *C. mongolica* auct. non Bge. 1842: Muravieva l. c. 45. f. 2. 1928. Hand.-Mazz. in Acta Hort. Gothob. 13:331. 1939; Kitagawa, Lineam. Fl. Mansh. 258. 1939.


多年生草本;茎数个,丛生,直立或上升,高 5—18 厘米,不分枝,有柔毛或无毛,基部木质。基生叶长 1.5—4 厘米,三全裂,裂片窄条形,全缘或二至三深裂,叶及叶柄均有长柔毛及腺毛;叶柄长 1.5—2 厘米;托叶条形,长 4—5 毫米,不裂;茎生叶三至五裂,下部者具短柄,上部者无柄。聚伞花序二歧,形成圆锥花序,有多数花;总花梗及花梗稍具短腺毛;苞片及小苞片条形,长 2—4 毫米,有柔毛;花直径 5—6 毫米;花梗长 3—5 毫米;萼筒筒状,长 3—4 毫米,仅基部有短柔毛,具 10 脉,萼片三角卵形,长 2 毫米,先端渐尖,有柔毛及腺毛;花瓣倒卵形,长 4—6 毫米,粉红色,先端近圆形,基部渐窄成爪,无毛;花丝无毛,比花瓣短;心皮 6—10,离生。瘦果长圆形,长 2 毫米,无毛。 花期 6 月,果期 8 月。

产黑龙江、内蒙古。生于草原或山坡。蒙古、苏联有分布。

39. 草莓属——*Fragaria* L.

L. Sp. Pl. 494. 1753 & Gen. Pl. ed. 5. 218. 1754; Benth. & Hook. f. Gen. Pl. 1:620. 1865. p. p.; Eocke in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(3):33. 1888; Lozinsk. in Bull. Jard. Bot. Princ. URSS 25: 47—88. 1926; Hutch. Gen. Flow. Pl. 1:198. 1964.

多年生草本。通常具纤匐枝,常被开展或紧贴的柔毛。叶为三出或羽状五小叶;托叶膜质,褐色,基部与叶柄合生,鞘状。花两性或单性,杂性异株,数朵成聚伞花序,稀单生;萼筒倒卵圆锥形或陀螺形,裂片 5,镊合状排列,宿存,副萼片 5,与萼片互生;花瓣白色,稀淡黄色,倒卵形或近圆形;雄蕊 18—24 枚,花药 2 室;雌蕊多数,着生在凸出的花托上,彼此分离;花柱自心皮腹面侧生,宿存;每心皮有一胚珠。瘦果小形,硬壳质,成熟时着生在球形或椭圆形肥厚肉质花托凹陷内。种子 1 颗,种皮膜质,子叶平凸。 染色体基数 $x =$



1—4. 地蔷薇 *Chamaerhodos erecta* (L.) Bge. 1. 植株, 2. 基生叶, 3. 花纵剖面, 4. 雌蕊。5--8. 阿尔泰地蔷薇 *Chamaerhodos altaica* (Laxm.) Bge.: 5. 植株, 6. 基生叶, 7. 花纵剖面, 8. 雌蕊。9. 灰毛地蔷薇 *Chamaerhodos canescans* J. Krause: 基生叶。10. 三裂地蔷薇 *Chamaerhodos trifida* Ledeb.: 基生叶。11. 砂生地蔷薇 *Chamaerhodos sabulosa* Bge.: 基生叶。(王金凤绘)