

Duchesnea chrysantha (Zoll. et Mor.) Miq. Fl. Ind. Bat. 1:372. 1855; Hara et Kurosawa in Journ. Jap. Bot. 34:165. f. 1B, 2B. 1959; 海南植物志 2: 198. 图 402. 1965; Liu et Su in Fl. Taiwan 3:63. pl. 479. 1977. —*Fragaria chrysantha* Zoll. et Mor. Syst. Verz. 7. 1846. —*Fragaria indica* Andr. var. *wallichii* Franch. et Sav. Enum. Pl. Jap. 1:129. 1873. excl. syn. *Potentilla wallichiana*. —*Potentilla indica* (Andr.) Wolf var. *wallichii* (Franch. et Sav.) Wolf in Bibl. Bot. 71:666. 1908. —*D. wallichiana* Nakai ex Hara in Journ. Jap. Bot. 10:221. 1934. excl. basionym. —*D. formosana* Odashima in Journ. Soc. Trop. Agr. 7: 79. 1935. —*D. indica* auct. non (Andr.) Focke 1888: Merr. in Lingn. Sci. Journ. 5: 87. 1927; Li in Lloydia 14:231. 1951.

多年生草本，匍匐茎长 30—50 厘米，有柔毛。小叶片菱形、倒卵形或卵形，长 1.5—2.5 厘米，宽 1—2 厘米，先端圆钝，有时具凸尖，基部楔形，边缘有钝或锐锯齿，近基部全缘，上面近无毛，下面疏生长柔毛，中间小叶有时具 2—3 深裂，有短柄；叶柄长 1.5—3 厘米，有柔毛；托叶披针形，长 2—3 毫米，有柔毛。花直径 5—15 毫米；花梗长 2—3 厘米，疏生长柔毛；萼片卵形或卵状披针形，长 3—5 毫米，先端渐尖，外面有长柔毛，具缘毛；副萼片三角状倒卵形，长 3—7 毫米，外面疏生长柔毛，先端有 3—5 锯齿；花瓣倒卵形，长 2.5—5 毫米，黄色，先端微凹或圆钝，无毛；花托在果期粉红色，无光泽，直径 8—12 毫米。瘦果卵形，长 4—6 毫米，红色，具多数显明皱纹，无光泽。花期 5—7 月，果期 6—9 月。

产陕西、四川、云南、广西、广东、福建、台湾。生在草地上。日本、朝鲜、印度、印度尼西亚也有分布。

茎叶药用，捣烂治蛇咬、烫伤、疗疮等病。

41. 蔷薇属——*Rosa* L.*

L. Sp. Pl. 491. 1753; Gen. Pl. ed. 5. 217. 1754; Benth. & Hook.

f. Gen. Pl. 1: 625. 1865; Focke in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam.

3(3): 46. 1888; Hutch. Gen. Flow. Pl. 1: 209. 1964.

直立、蔓延或攀援灌木，多数被有皮刺、针刺或刺毛，稀无刺，有毛、无毛或有腺毛。叶互生，奇数羽状复叶，稀单叶；小叶边缘有锯齿；托叶贴生或着生于叶柄上，稀无托叶。花单生或成伞房状，稀复伞房状或圆锥状花序；萼筒(花托)球形、坛形至杯形、颈部缢缩；萼片 5，稀 4，开展，覆瓦状排列，有时呈羽状分裂；花瓣 5，稀 4，开展，覆瓦状排列，白色、黄色，粉红色至红色；花盘环绕萼筒口部；雄蕊多数分为数轮，着生在花盘周围；心皮多数，稀少数，着生在萼筒内，无柄极稀有柄，离生；花柱顶生至侧生，外伸，离生或上部合生；胚珠单生，下

* 属的异名 *Rhodophora* Neck (1790), *Hulthemia* Dumort. (1824), *Lowea* Lindl. (1837), *Hultenia* Reichb. (1837), *Rhodopsis* Reichb. (1841), *Saintpierreia* Germ. de St. Pierre (1878), *Ernestella* Germ. de St. Pierre (1878), *Platyrodon* Housé (1827), *Hesperhodos* Cockerell (1913)

垂。瘦果木质，多数稀少数，着生在肉质萼筒内形成蔷薇果；种子下垂。染色体基数 $x=7$ 。

本属的模式种：百叶蔷薇 *Rosa centifolia* L.

全属约有 200 种，广泛分布亚、欧、北非、北美各洲寒温带至亚热带地区。我国产 82 种。

本属是世界著名的观赏植物之一，庭园普遍栽培。中国蔷薇已有悠久栽培历史，远在 1630 年王象晋作《群芳谱》，1688 年陈淏子作《秘传花镜》，1708 年汪灏作《广群芳谱》，已有蔷薇、月季花、玫瑰花、木香花等品种的记载。欧洲蔷薇在 18 世纪以前只有法国蔷薇 *R. gallica* L.、百叶蔷薇 *R. centifolia* L. 和突厥蔷薇 *R. damascena* Mill. 等少数种类，但缺少四季开花的品种，又没有开黄花的品种。中国蔷薇在 18—19 世纪间输入英法后，大受西方人士重视。他们用中国蔷薇和原有的品种杂交和反复回交，培育出许多优美新品种。中国原产蔷薇植物特别是月季花 *R. chinensis* Jacq.、香水月季 *R. odorata* Sweet、野蔷薇 *R. multiflora* Thunb.、光叶蔷薇 *R. wichuriana* Crép. 和玫瑰 *R. rugosa* Thunb. 在创造现代蔷薇新品种中起着重要的作用。

蔷薇属植物花香宜人，许多种可供提炼珍贵芳香油之用，常用品种为突厥蔷薇、玫瑰花、山刺玫、野蔷薇等。果实成熟后味酸甜可食、富含维生素 C，为治疗心血管病等重要药品，其中如玫瑰、缙丝花、山刺玫、弯刺蔷薇、腺齿蔷薇等大果类型最为著名。此外本属中月季花(花、叶、根)、玫瑰花(花瓣)、金樱子(果、叶、根)、小果蔷薇(根)、西北蔷薇(果)、缙丝花(果、根)、野蔷薇(叶、花、果、根)、硕苞蔷薇(花、果、根)等均为各地常用的中草药，各有特效。

蔷薇属分类系统总览

亚属 1. 单叶蔷薇亚属 Subgen. *Hulthemia* (Dumort.) Focke 单叶，无托叶；花单生；萼筒坛状，多针刺。(种 1)

亚属 2. 蔷薇亚属 Subgen. *Rosa* 羽状复叶，有托叶；花常成伞房状花序或单生；萼筒坛状稀杯状。

组 1. 芹叶组 Sect. *Pimpinellifoliae* DC. 直立灌木，枝常有直立皮刺或针刺；小叶片 7—9，稀 15—17，常小形；托叶窄狭，贴生叶柄上，有耳；花单生，无苞片；萼片全缘，直立，宿存；花柱离生，不外伸。

系 1. 五数花系 Ser. *Spinossissimae* Yü et Ku 萼片和花瓣均为 5 数，花通常黄色，稀白色或粉红色。(种 2—13)

系 2. 四数花系 Ser. *Sericiceae* (Crép) Yü et Ku 萼片和花瓣均为 4 数，花白色，稀淡黄色。(种 14—19)

组 2. 蔷薇组 Sect. *Rosa* 矮生灌木，有弯曲皮刺和针刺；托叶窄狭，与叶柄贴生；小叶片 3—5 极稀 7；花数朵或单生；萼片先端常分裂，花后反折，凋落；花柱离生，不外伸。(种 20—23)

组 3. 桂味组 Sect. *Cinnamomeae* DC. 直立灌木，有散生或成对皮刺，常有针刺；小叶片 5—15；托叶有宽有窄，贴生叶柄上；花常多朵，稀单生，有宽大苞片；萼片常全缘，花后直立，宿存稀凋落；花柱离生，不外伸或稍外伸。

系 3. 脱萼系 Ser. *Beggerianae* Yü et Ku 花托上部在果实成熟之后与萼片、花盘、花柱一起脱

落。(种 24—27)

系 4. 宿萼大叶系 Ser. *Cinnamomeae* Yü et Ku 萼片、花盘在果实成熟后宿存;小叶片长 1.5—7 厘米,大部分先端急尖;花多数呈伞房状,或少花稀单花。(种 28—45)

系 5. 宿萼小叶系 Ser. *Webbianae* Yü et Ku 萼片、花盘在果实成熟时宿存;小叶片长在 1.5 厘米以下极稀至 2 厘米;花单生或少花。(种 46—54)

组 4. 月季组 Sect. *Chinenses* DC. ex Ser. 直立或攀援灌木,有弯曲皮刺;小叶片 3—5,稀 7;托叶窄狭,贴生叶柄上;花 1 至多朵;萼片全缘或有少数裂片,花后反折凋落;花柱离生,外伸(种 55—57)。

组 5. 合柱组 Sect. *Synstylae* DC. 攀援灌木,稀直立,有弯曲皮刺;小叶 5—9,稀 3,托叶全缘、有齿或篦齿状分裂,贴生叶柄上;花多朵成伞房状花序;萼片常羽裂稀全缘,花后反折,凋落;花柱联合成柱状,伸出萼筒外。

系 6. 齿裂托叶系 Ser. *Multiflorae* Yü et Ku 托叶篦齿状或具有不规则锯齿,边缘有腺或无腺。(种 58—64)

系 7. 全缘托叶系 Ser. *Brunonianae* Yü et Ku 托叶全缘不分裂,边缘常有腺。(种 65—75)

组 6. 木香组 Sect. *Banksianae* Lindl. 常绿攀援灌木,有或无皮刺;小叶片 3—7;托叶钻状,离生,早落;花多朵成伞形或复伞房状花序;萼片全缘或有裂片,反折,花后凋落;花柱离生,稍外伸(种 76—77)

组 7. 金樱子组 Sect. *Laevigatae* Thory 常绿攀援灌木,有散生弯曲皮刺;小叶片 3;托叶有齿,离生或基部贴生叶柄上,早落;花大形,单生,无苞片,花梗萼筒密被针刺;萼片直立、全缘、宿存;花柱离生,不外伸。(种 78)

组 8. 硕苞组 Sect. *Bracteatae* Thory 常绿攀援灌木,有成对弯曲皮刺;小叶片 5—9;托叶篦齿状分裂,基部贴生叶柄上;花单生,有大形苞片,萼筒外被绒毛,萼片全缘,花后反折;花柱离生,稍外伸(种 79)。

组 9. 小叶组 Sect. *Microphyllae* Crép. 开展灌木,有对生皮刺;小叶片 5—9;托叶窄狭有钻状耳部,贴生叶柄上;花 1—2 朵,有小形苞片,早落;萼筒杯状,密被针刺,萼片直立有羽状裂片,宿存;花柱离生,不外伸。(种 80—82)

蔷薇属分组检索表

- 1. 单叶,无托叶;花单生;萼筒坛状……………亚属 1. 单叶蔷薇亚属 Subgen. *Hulthemia* (Dumort.) Focke
- 1. 羽状复叶,有托叶;花常成伞房状花序或单生……………亚属 2. 蔷薇亚属 Subgen. *Rosa*
 - 2. 萼筒坛状;瘦果着生在萼筒边周及基部。
 - 3. 托叶大部分贴生叶柄上,宿存。
 - 4. 花柱离生,不外伸或稍外伸,比雄蕊短。
 - 5. 花单生,无苞片,稀有数花。
 - 6. 小叶 5—9,稀 15—17,常小形;花常白色或黄色……………1. 芹叶组 Sect. *Pimpinellifoliae* DC.
 - 6. 小叶 3—5;花常粉或红色……………2. 蔷薇组 Sect. *Rosa*
 - 5. 花多数成伞房花序或单生均有苞片,小叶 5—11……………3. 桂味组 Sect. *Cinnamomeae* DC.
 - 4. 花柱外伸。
 - 7. 花柱离生,短于雄蕊;小叶常 3—5……………4. 月季组 Sect. *Chinenses* DC.
 - 7. 花柱合生,结合成柱,约与雄蕊等长;小叶 5—9……………5. 合柱组 Sect. *Synstylae* DC.
 - 3. 托叶离生或近离生,早落。
 - 8. 小枝光滑无毛;小叶 3—5;花柱离生,不外伸。
 - 9. 花梗和萼筒均光滑;花小,黄色或白色,多花成花序;托叶钻形……………

- 6. 木香组 Sect. *Banksianae* Lindl.
- 9. 花梗和萼筒被针刺;花大,白色,单生;托叶有齿 7. 金櫻子组 Sect. *Laevigatae* Thory
- 8. 小枝密被绒毛或柔毛;小叶 7—9, 托叶篋齿状分裂;花单生有大形苞片;花柱离生,稍外伸.....
- 8. 碩苞组 Sect. *Bracteatae* Thory
- 2. 萼筒杯状;瘦果着生在基部突起的花托上;花柱离生不外伸.....
- 9. 小叶组 Sect. *Microphyllae* Crép.

薔薇属分种检索表(主要根据枝叶的特征)

- 1. 单叶,无托叶;花单生,黄色..... 1. 小葉叶薔薇 *R. berberifolia* Pall.
- 1. 复叶,有托叶。
 - 2. 托叶离生,脱落。
 - 3. 小叶 3—5(—7);苞片小或无。
 - 4. 小叶 3(—5), 椭圆卵形或倒卵形,两面无毛;花单生,直径 5—7 厘米,白色,花梗,萼筒密被刺毛 78. 金櫻子 *R. laevigata* Michx.
 - 4. 小叶 3—5(—7), 椭圆卵形至长圆披针形;花直径 1.5—2.5 厘米,黄色或白色,花梗及萼筒常光滑。
 - 5. 伞形花序,萼片全缘 76. 木香花 *R. banksiae* Ait.
 - 5. 复伞房花序,萼片有羽状裂片..... 77. 小果薔薇 *R. cymosa* Tratt.
 - 3. 小叶 5—9, 椭圆形至倒卵形,托叶篋齿状分裂;花单生,直径 4.5—7 厘米,白色;苞片大形,条裂,外面密被绒毛..... 79. 碩苞薔薇 *R. bracteata* Wendl.
 - 2. 托叶与叶柄合生,不脱落。
 - 6. 托叶篋齿状或有不规则锯齿;花柱合生,伸出萼筒外。
 - 7. 托叶篋齿状。
 - 8. 小叶片 1.5—3 厘米,仅下面被柔毛,花多数,排成圆锥状花序..... 58. 野薔薇 *R. multiflora* Thunb.
 - 8. 小叶片长不超过 1 厘米,两面被柔毛;花单生..... 59. 单花薔薇 *R. uniflora* Yü et Ku
 - 7. 托叶有不规则锯齿。
 - 9. 小叶 3(—5), 卵状披针形或长圆披针形,两面无毛;花单生或成伞房花序,粉白色。花柱有毛..... 64. 银粉薔薇 *R. anemoniflora* Fort.
 - 9. 小叶 (5—)7—9, 椭圆形、卵形或倒卵形,不为披针形;花数朵成伞房花序。
 - 10. 小叶下面密被长柔毛;花柱有毛。
 - 11. 小叶 5—7, 上面沿中脉被毛;花白色,直径 1.5—2 厘米,花梗、萼筒密被柔毛和腺毛 60. 广东薔薇 *R. kwangtungensis* Yü et Tsai
 - 11. 小叶 3—5(—7), 上面无毛;花粉红色,直径 2.5—3 厘米,花梗萼筒光滑无毛,稀有少数腺毛 61. 丽江薔薇 *R. lichiangensis* Yü et Ku
 - 10. 小叶下面无毛或近于无毛。
 - 12. 小叶 5—7 稀 9, 先端圆钝或急尖,花柱有毛。果球形或近球形..... 62. 光叶薔薇 *R. wichuraiana* Crép.
 - 12. 小叶 7—9, 稀 5, 先端急尖或渐尖,下面脉上有柔毛;花柱无毛;果卵球形 63. 伞花薔薇 *R. maximowicziana* Regel
 - 6. 托叶全缘,花柱离生稀合生。

13. 小叶 3—5(—7) 片。

14. 叶边有单锯齿, 稀混有少数重锯齿。

15. 老枝有皮刺、针刺或刺毛。

16. 皮刺大小不一致, 单锯齿有时混有重锯齿。

17. 小叶 3—5, 厚纸质; 花单生, 粉红色或红色, 重瓣, 直立……………20. 法国蔷薇 *R. gallica* L.

17. 小叶 5, 薄纸质; 花单生, 粉红色重瓣, 下垂……………21. 百叶蔷薇 *R. centifolia* L.

16. 皮刺大小一致, 全部单锯齿。

18. 叶厚, 上面多皱, 下面密被绒毛; 小叶 5—7(—9), 小枝及皮刺外被绒毛; 花单生或 2—3 朵, 紫红色至白色; 果扁球形, 砖红色……………33. 玫瑰 *R. rugosa* Thunb.

18. 叶薄, 上面光滑, 下面有毛或仅中脉有毛。

19. 花单生。

20. 花粉红色; 小叶 3—7; 果梨形或长椭圆形, 有长颈, 红色……………35. 刺蔷薇 *R. acicularis* Lindl.

20. 花紫红色; 小叶 3(—5); 果倒卵球形或梨形, 无颈, 紫色……………57. 亮叶月季 *R. lucidissima* Lévl.

19. 花数朵成伞房花序

21. 小叶 5—7, 卵形或卵状长圆形; 花粉红色, 多重瓣, 花梗萼筒常被腺毛; 果倒卵球形, 红色, 多刺毛……………22. 突厥蔷薇 *R. damascena* Mill.

21. 小叶 5, 宽椭圆形或卵形; 花白色或稍带粉红色, 多重瓣, 花梗有腺毛, 萼筒常光滑; 果长圆卵球形, 红色, 光滑……………23. 白蔷薇 *R. X alba* L.

15. 老枝只有皮刺, 无针刺和刺毛。

22. 叶片下面完全无毛。

23. 直立灌木。

24. 小叶 3—5, 宽卵形至卵状长圆形, 长 2.5—6 厘米, 先端渐尖; 花单生稀数朵, 红色、粉红稀白色; 花柱离生, 萼片常羽裂; 果卵球形至梨形, 红色……………55. 月季花 *R. chinensis* Jacq.

24. 小叶 7, 椭圆形或倒卵形, 长 1—3 厘米, 先端圆钝或急尖; 花多朵成伞房花序, 白色, 花柱合生, 萼片全缘; 果卵球形, 桔红色……………72. 川滇蔷薇 *R. soulicana* Crep.

23. 攀援藤本。

25. 花单生或 2—3 朵; 花柱离生。

26. 小叶 5—7, 椭圆形至卵形, 先端急尖至渐尖; 花黄色、粉红色或白色, 萼片全缘, 果扁球形……………56. 香水月季 *R. odorata* Sweet

26. 小叶 3(—5), 长卵形或长椭圆形, 先端尾状渐尖或急尖; 花紫红色, 萼片全缘或稍有缺刻, 果梨形或倒卵球形……………57. 亮叶月季 *R. lucidissima* Lévl.

25. 花多数成伞房花序或复伞房花序; 花柱合生。

27. 小叶 3—5, 小叶片较大, 长 3.5—12 厘米。

28. 小叶片纸质; 花瓣外面无毛, 花多朵排成伞房状花序……………73. 软条七蔷薇 *R. henryi* Bouleng.

28. 小叶片革质; 花瓣外面有毛, 花多朵排成复伞房状花序……………70. 毛萼蔷薇 *R. lasiosepaia* Metc.

27. 小叶 7—9, 稀 5, 小叶片革质, 较小, 长 3—7 厘米; 花瓣外面有毛, 花多朵排成

- 伞房状花序……………69. 长尖叶蔷薇 *R. longicuspis* Bertol.
22. 叶片下面多少被毛。
29. 叶边锯齿圆钝, 小叶长度在 1.5 厘米以下。小叶 3—5, 长圆形至菱状卵形, 先端急尖至圆钝; 花 3—5 朵成伞房状, 白色, 未开时粉红色, 花柱离生……………49. 粉蕾木香 *R. pseudobanksia* Yü et Ku
29. 叶边锯齿尖锐, 小叶长度在 2 厘米以上; 花多朵排成复伞房花序, 花瓣白色, 花柱合生。
30. 叶片两面有毛; 小枝密被柔毛; 小叶 5—7, 长圆形或长圆披针形; 果卵球形, 紫褐色, 外有毛……………65. 复伞房蔷薇 *R. brunonii* Lindl.
30. 叶片上面无毛; 小枝无毛或稍有毛。
31. 叶片上面叶脉下陷多皱, 下面叶脉突起, 密被灰白色柔毛; 小叶 5—7, 长圆形至长圆倒卵形; 果近球形, 桔红色……………66. 绣球蔷薇 *R. glomerata* Rehd. et Wils.
31. 叶片上面平滑, 下面仅中脉突起。
32. 叶片下面有腺, 近无毛; 花梗、叶柄及叶轴均有腺; 小叶 5—7, 长圆卵形至披针形, 先端渐尖; 果近球形, 猩红色……………71. 腺梗蔷薇 *R. filipes* Rehd. et Wils.
32. 叶片下面无腺, 密被柔毛; 小叶 (3—)5, 卵状椭圆形至倒卵形, 先端尾状渐尖或急尖; 果近球形, 猩红色……………67. 悬钩子蔷薇 *R. rubus* Lévl. et Vant.
14. 叶边有重锯齿。
33. 直立灌木, 高不超过 1.5 米; 小枝密被皮刺和针刺; 小叶 3—5, 厚纸质, 宽椭圆形或卵形, 先端圆钝或短渐尖, 叶边重锯齿, 有时为单锯齿; 花单生, 粉色或红色, 常重瓣……………20. 法国蔷薇 *R. gallica* L.
33. 直立攀援灌木, 高在 1.5 米以上; 小枝有稀疏皮刺或无刺。
34. 叶片两面无毛或下面沿脉有柔毛。
35. 小叶 3—5(—7), 叶片卵状长圆形或椭圆形, 长 2.5—6 厘米, 先端急尖; 花多朵成伞房花序, 红色, 直径 2—2.5 厘米; 花柱离生, 显著外伸……………29. 伞房蔷薇 *R. corymbulosa* Rolfe
35. 小叶 3—5, 叶片倒卵形或椭圆形, 长 0.8—1.5 厘米; 先端圆钝或截形花单生或 2—3 朵集生, 白色, 直径约 1 厘米; 花柱合生稍外伸……………74. 重齿蔷薇 *R. duplicata* Yü et Ku
34. 叶片下面散生柔毛和腺毛。
36. 小叶 3—5, 叶片卵形、椭圆形至长圆形, 长 1.2—2.5 厘米, 先端急尖; 花多朵成伞房状花序, 白色, 直径约 1.5 厘米; 花柱合生, 稍外伸……………75. 维西蔷薇 *R. weisiensis* Yü et Ku
36. 小叶 5(—7), 叶片椭圆形、长圆形或卵形, 长 1.5—3.2 厘米, 先端急尖或圆钝; 花单生, 粉红色, 直径 2.5—3 厘米; 花柱离生, 稍伸出……………40. 城口蔷薇 *R. chengkouensis* Yü et Ku
13. 小叶在 (5—)7 片以上。
37. 小叶片长在 1.5(—2) 厘米以下。
38. 小叶边缘有单锯齿, 稀部分有重锯齿。
39. 叶片下面光滑无毛, 稀在幼嫩时有柔毛, 不久全部脱落无毛。
40. 枝条有皮刺、针刺和刺毛。
41. 叶边全部有锯齿。
42. 小叶 (5—)7—9(—11), 近圆形或长圆卵形; 花粉白或黄色; 果黑色……………

- 2. 密刺蔷薇 *R. spinosissima* L.
42. 小叶片 5—13, 卵形, 椭圆形或倒卵形; 花黄色; 果紫红色.....
- 7. 黄蔷薇 *R. hugonis* Hemsl.
41. 叶边近基部全缘; 小叶 7—11, 椭圆形至卵形; 花粉红色; 果硃红色.....
- 3. 刺毛蔷薇 *R. farreri* Stapf
40. 枝条只有皮刺, 无针刺和刺毛。
43. 皮刺基部宽大。
44. 叶边全部有锯齿。
45. 皮刺直立; 小叶 7—13, 宽卵形, 近圆形, 稀椭圆形, 锯齿较钝; 花黄色; 果紫褐色, 萼片宿存..... 8. 黄刺玫 *R. xanthina* Lindl.
45. 皮刺弯曲如钩状; 小叶 5—9, 广椭圆形或椭圆倒卵形, 锯齿较锐; 花白色或粉色; 果红色转黑紫色, 熟时萼片脱落..... 24. 弯刺蔷薇 *R. beggeriana* Schrenk
44. 叶边近基部全缘。
46. 枝上皮刺散生。
47. 小叶 5—7, 近圆形, 倒卵形或长圆形; 花黄色, 无苞片, 果外面光滑.....
- 6. 宽刺蔷薇 *R. platyacantha* Schrenk
47. 小叶 (5)7(—9), 近圆形或卵形; 花白色稀粉红色, 有苞片; 果外密被腺毛.....
- 53. 腺果蔷薇 *R. fedtschenkoana* Regel
46. 枝上刺常成对生; 小叶 7—11, 长圆形, 宽倒卵形, 先端截形; 花白色, 4 瓣; 果红色, 外面光滑..... 16. 玉山蔷薇 *R. morrisonensis* Hayata
43. 皮刺直细。
48. 叶边全部有锯齿, 先端多急尖; 小叶 9—15, 椭圆形, 长圆形至倒卵形; 花粉红色; 果外密生针刺..... 80. 缙丝花 *R. roxburghii* Tratt.
48. 叶边基部近全缘, 先端多圆钝或截形。
49. 枝上皮刺散生。
50. 小叶 7—11, 椭圆形至卵状椭圆形; 花梗长 1.5—3 厘米, 花粉红色; 果卵球形, 深红色..... 51. 钝叶蔷薇 *R. sertata* Rolfe
50. 小叶 5—9, 近圆形, 倒卵形或宽椭圆形; 花梗长 1—1.4 厘米, 花淡红色; 果近球形, 淡红色..... 52. 藏边蔷薇 *R. webbiana* Royle
49. 枝上皮刺常成对; 小叶 7—11(—13), 长圆形至宽倒卵形; 花白色; 果红色.....
- 16. 玉山蔷薇 *R. morrisonensis* Hayata
39. 叶片下面或在中脉被柔毛。
51. 枝条上有皮刺, 并有时密被针刺或刺毛。
52. 叶边全部有锯齿。
53. 花 4 瓣, 白色; 果亮红色; 果梗短成熟时肥厚..... 15. 峨眉蔷薇 *R. omeiensis* Rolfe
53. 花 5 瓣, 白色或粉白色; 果梗细长, 成熟时不肥厚。
54. 小枝密被针刺; 小叶 7—11; 花粉白色..... 4. 长白蔷薇 *R. koreana* Kom.
54. 小枝通常仅具皮刺; 小叶 11—13; 花白色.....
- 13. 秦岭蔷薇 *R. tsinglingensis* Pax. et Hoffm.
52. 叶边中部以上有锯齿, 下部全缘。
55. 叶片仅下面有柔毛。
56. 萼片在果熟时脱落; 小叶 7—15, 椭圆形至长圆形, 先端钝; 花粉色, 花梗和萼筒常有

- 腺毛.....26. 铁杆蔷薇 *R. prattii* Hemsl.
56. 萼片在果熟时宿存。
57. 小叶 7—9(—13), 倒卵形至长圆倒卵形; 花淡黄色, 4 瓣; 果桔黄色, 果梗肥厚.....
..... 14. 求江蔷薇 *R. taronensis* Yü et Ku
57. 小叶 7—11, 卵形或倒卵形, 稀倒卵长圆形; 花白色, 4 瓣; 果红色, 有细果梗.....
..... 17. 绢毛蔷薇 *R. sericea* Lindl.
55. 叶片上下两面均密被柔毛; 小叶 5—9(—11), 长圆倒卵形或倒卵形; 花白色, 4 瓣; 果红色, 有细果梗 18. 毛叶蔷薇 *R. mairei* Lévl.
51. 枝条有直细或宽扁皮刺, 无针刺和刺毛。
58. 叶片上下两面均密被柔毛; 小叶 7—13, 倒卵形或广椭圆形; 花红色; 果外散生针刺稀光滑
..... 82. 中甸刺玫 *R. praelucens* Byhouwer
58. 叶片仅在下面或下面中脉有柔毛。
59. 小叶先端急尖, 渐尖, 稀圆钝。
60. 花单生, 无苞片, 白色 11. 高山蔷薇 *R. transmorrisonensis* Hayata
60. 花多朵成伞房花序, 稀圆锥花序。
61. 小叶 7—9, 卵形, 倒卵形或近圆形, 先端圆钝; 花红色, 多朵成伞房花序, 稀圆锥
花序, 有多数苞片; 花柱分离, 稍外伸.....
..... 47. 多苞蔷薇 *R. multibracteata* Hemsl. et Wils
61. 小叶 (5)7—9, 长圆卵形至卵状披针形, 先端短渐尖; 花白色, 多朵成伞房花序,
苞片窄披针形, 早落; 花柱合生, 外伸.....68. 卵果蔷薇 *R. helenae* Rehd. et Wils.
59. 小叶先端多圆钝, 稀急尖。
62. 果实在成熟时萼片宿存。
63. 苞片 3—5 枚, 叶质, 卵形, 永存; 小叶通常 5, 稀 3 或 7
..... 48. 短脚蔷薇 *R. calyptopoda* Caud.
63. 苞片 1—2, 膜质, 卵状披针形, 脱落稀永存; 小叶 7—9。
64. 小叶边缘全部有锯齿; 花粉红色, 花梗短, 长不超过 1 厘米; 果卵球形; 皮刺
较短..... 50. 陕西蔷薇 *R. giraldii* Crép.
64. 小叶边缘大部有锯齿近基部全缘; 花淡红色, 花梗长 1—1.5 厘米; 果近球形;
皮刺较长, 淡黄色.....52. 藏边蔷薇 *R. webbiana* Royle
62. 果实在成熟期萼片脱落; 小叶 7—9(—11), 椭圆形, 倒卵形或近圆形.....
.....27. 小叶蔷薇 *R. willmottiae* Hemsl.
38. 小叶边有显明重锯齿。
65. 叶片下面无毛无腺; 枝条有皮刺、针刺或刺毛; 小叶 (5)7—9(—11), 近圆形或长圆卵形, 叶边
部分有单锯齿; 花单生或 2—3 朵, 黄色或白色; 果近球形, 黑色.....
..... 2. 密刺蔷薇 *R. spinosissima* L.
65. 叶片下面有腺或有毛。
66. 枝条有皮刺, 针刺和刺毛。
67. 叶片两面密被柔毛, 下面有腺; 小叶 7—9(—13), 长圆形至倒卵形; 花单生, 白色, 4 瓣;
果近球形, 红色 19 川西蔷薇 *R. sikangensis* Yü et Ku
67. 叶片上面无毛, 下面有毛。
68. 小叶 5—9 片。
69. 小叶长圆形, 下面有腺; 花单生有苞片, 白色 5 瓣; 果卵球形, 红色.....

-54. **西藏蔷薇** *R. tibetica* Yü et Ku
- 69. 小叶卵形、椭圆形或倒卵形, 下面有腺或有毛; 花单生, 无苞片, 白色或黄色, 5 瓣; 果近球形, 暗紫色..... 5. **腺叶蔷薇** *R. kokanica* Regel
- 68. 小叶 11—13, 椭圆形或长圆形; 花单生, 无苞片, 白色, 5 瓣; 果倒卵形, 红褐色.....
.....13. **秦岭蔷薇** *R. tsinglingensis* Pax
- 66. 枝条只有皮刺, 无针刺或刺毛。
- 70. 叶片两面有毛; 小叶 5—9, 宽卵形或倒卵形; 花单生, 稀数朵, 无苞片, 黄色重瓣.....
.....10. **重瓣异味蔷薇** *R. foetida* Herrm. var. *persiana* (Lam.) Rehd
- 70. 叶片下面无毛或近于无毛。
- 71. 小叶片先端急尖或圆钝。
- 72. 小叶 (7)9—15, 椭圆形、椭圆状倒卵形至长椭圆形, 叶边锯齿较钝, 下面有腺; 花单生, 淡黄色; 果近球形, 黑褐色 9. **櫻草蔷薇** *R. primula* Bouleng.
- 72. 小叶 9—11, 卵形或椭圆形, 叶边锯齿较尖锐, 下面有毛或无毛; 花单生, 粉红色; 果倒卵形, 红色.....12. **细梗蔷薇** *R. graciliflora* Rehd. et Wils.
- 71. 小叶片先端圆钝或截形。
- 73. 小叶 5—7(—9), 近圆形、卵形或倒卵形, 叶边锯齿较钝, 下面无腺; 花 3—5, 稀单生, 深红色; 果卵球形, 红色, 萼片宿存.....46. **滇边蔷薇** *R. forrestiana* Bouleng.
- 73. 小叶 7—9(—11), 椭圆形, 倒卵形或近圆形, 叶边锯齿较锐, 下面有腺; 花常单生, 粉红色; 果长圆形, 桔红色, 熟时萼片脱落.....
..... 27. **多腺小叶蔷薇** *R. willmottiae* Hemsl. var. *glandulifera* Yü et Ku
- 37. 小叶片长在 2 厘米以上。
- 74. 叶边有单锯齿。
- 75. 叶片下面无毛或近于无毛。
- 76. 枝上皮刺弯曲如镰刀状。
- 77. 小叶 5—9, 广椭圆形至椭圆倒卵形; 花数朵或多朵, 稀单生, 白色稀粉色; 果近球形, 红色至暗紫色, 熟时萼片脱落..... 24. **弯刺蔷薇** *R. beggeriana* Schrenk
- 77. 小叶 7—9, 椭圆形, 长圆形或卵形, 稀倒卵形; 花数朵, 白色; 果长圆形或卵球形, 红色, 熟时萼片宿存..... 37. **疏花蔷薇** *R. laxa* Retz.
- 76. 枝上皮刺直立。
- 78. 老枝有皮刺并有时密被刺毛。
- 79. 花 1—3(—5)朵, 粉红色; 花柱离生, 有毛; 果熟时萼片宿存。
- 80. 小枝密被针刺; 花 1—3 朵, 花梗长 1.5—3 厘米
.....43. **全针蔷薇** *R. persetosa* Rolfe
- 80. 小枝通常仅有皮刺; 花梗长 5—10 毫米。
- 81. 花梗和萼筒常密被腺毛; 小叶片椭圆形或卵形; 果椭圆状卵球形, 猩红色.....
..... 39. **美蔷薇** *R. bella* Rehd. et Wils.
- 81. 花梗和萼筒常光滑无毛; 小叶片长圆形或宽披针形; 果近球形或卵球形, 红色 34. **光叶山刺玫** *R. davurica* Pall. var. *glabra* Liou.
- 79. 花多朵成伞房花序; 花白色, 花柱合生, 无毛; 果熟时萼片脱落.....
..... 63. **伞花蔷薇** *R. maximowicziana* Regel
- 78. 老枝只有皮刺, 无刺毛。
- 82. 皮刺宽扁。

83. 花紅色,多朵,成傘房花序;萼片先端延長成葉狀;花梗、萼筒常有腺,稀光滑……………30. 尾萼薔薇 *R. caudata* Baker
83. 花白色,多朵成復傘房花序;萼片有羽裂,萼筒外部有針刺……………81. 貴州繚絲花 *R. kweichowensis* Yü et Ku
82. 皮刺直細,稀少刺或無刺。
84. 小葉 7—9(—11),卵形至長橢圓形,先端急尖或圓鈍;花直徑 2—2.5 厘米,粉紅色,1 至數朵;萼片先端延長成葉狀;花梗、萼筒常光滑……………51. 鈍葉薔薇 *R. sertata* Rolfe
84. 小葉 7(—9),卵形至卵狀披針形,先端漸尖至急尖;花直徑 3.5—5 厘米,深紅色,單生,稀 2—3 朵;萼片先端延長成葉狀;花梗萼筒常光滑或有稀疏腺毛……………38. 大紅薔薇 *R. saturata* Baker
75. 葉片下面被毛或至少在中脈側脈上被毛。
85. 葉片上下兩面密被柔毛。
86. 枝上皮刺彎曲如鐮刀狀。
87. 小葉 5—9, 廣橢圓形至橢圓倒卵形;果近球形,紅色至暗紫色,熟時萼片脫落……………24. 毛葉彎刺薔薇 *R. beggeriana* Schrenk var. *lioui* (Yü et Tsai) Yü et Ku
87. 小葉 7—9, 橢圓形,長圓形或卵形;果長圓形,紅色,成熟時萼片宿存……………37. 毛葉疏花薔薇 *R. laxa* Retz. var. *mollis* Yü et Ku
86. 枝上皮刺扁直或無刺;小葉 7—13, 倒卵形或廣橢圓形,先端圓鈍或急尖;花紅色,單生;花梗萼筒密被絨毛和稀疏針刺;果扁球形,褐色,熟時萼片宿存……………82. 中甸刺玫 *R. praelucens* Byhouwer
85. 葉片上面光滑無毛,下面有毛。
88. 枝有皮刺、針刺或刺毛,稀無刺毛。
89. 果成熟後萼片脫落;小葉 7—15,橢圓形至長圓形,先端圓鈍(干時葉邊常反卷);花 1—3, 粉紅色,花梗和萼筒有腺毛;枝上有皮刺,有時被刺毛……………26. 鐵杆薔薇 *R. prattii* Hemsl.
89. 果成熟後萼片宿存。
90. 小葉片 9—15 先端急尖或短漸尖;花白色或帶粉紅色, 2—5(—7)朵,傘房狀排列……………45. 西南薔薇 *R. murielae* Rehd. et Wils.
90. 小葉片 3—9(—11), 花紅色或粉紅色。
91. 小葉 7—9(—11), 橢圓形至卵狀橢圓形,先端圓鈍;花 1—3 朵,粉紅色;花梗和萼筒光滑,稀有腺;枝上密被針刺和刺毛……………43. 全針薔薇 *R. persetosa* Rolfe
91. 小葉 3—7, 長圓形至寬橢圓形,先端急尖;花單生,粉紅色;花梗常有腺,稀光滑;枝上被皮刺或有針刺……………35. 刺薔薇 *R. acicularis* Lindl.
88. 枝有皮刺,無針刺和刺毛。
92. 小枝和皮刺外被絨毛;小葉 5—9, 橢圓形至橢圓倒卵形,上面多皺,下面多毛,有時有腺;花單生,紫色、紅色至白色;果扁球形,磚紅色,光滑……………33. 玫瑰 *R. rugosa* Thunb.
92. 小枝和皮刺光滑,稀無刺。
93. 花多朵成傘房花序。
94. 花梗萼筒光滑;小葉 7—9, 卵形、長圓形,稀長橢圓卵形,先端急尖;花粉紅色,花柱離生,稍伸出……………32. 擬木香 *R. banksiopsis* Baker
94. 花梗萼筒外被腺毛。
95. 小葉橢圓形至卵狀長圓形,先端急尖至漸尖;花粉紅色,花柱離生,稍伸出……

- 31. **西北蔷薇** *R. davidii* Crép.
- 95. 小叶长圆卵形至卵状披针形, 先端渐尖; 花白色, 花柱联合成束.....
- 68. **卵果蔷薇** *R. helenae* Rehd. et Wils.
- 93. 花单生, 稀 2—3 朵。
- 96. 花梗、萼筒光滑。
- 97. 小叶卵形至卵状披针形, 先端渐尖至急尖, 单锯齿; 花深红色; 果卵球形, 硃红色.....
- 38. **大红蔷薇** *R. saturata* Baker
- 97. 小叶长圆形或阔披针形, 先端急尖或圆钝, 下面有腺, 锯齿部分为重锯齿, 花粉红色; 果球形或卵球形, 红色.....
- 34. **山刺玫** *R. davurica* Pall.
- 96. 花梗、萼筒常有腺毛, 稀光滑。
- 98. 小叶 7—13, 卵形、椭圆形或长圆卵形, 先端急尖或圆钝; 花深红色, 萼片常有羽状裂片; 果长圆卵球形或卵球形, 桔红色, 长可达 5 厘米
- 42. **华西蔷薇** *R. moyesii* Hemsl. et Wils.
- 98. 小叶 9—11(—13), 长圆形或椭圆卵形, 先端急尖稀圆钝; 花红色; 萼片全缘; 果长圆卵球形至长倒卵形, 深红色, 长 1.5—3 厘米
- 44. **大叶蔷薇** *R. macrophylla* Lindl.
- 74. 叶边有重锯齿。
- 99. 枝上有皮刺和刺毛。
- 100. 小叶 7—9, 长圆形或阔披针形, 先端急尖或圆钝, 下面有短柔毛和腺点; 花深粉色; 果近球形或卵球形, 熟时萼片宿存.....
- 34. **山刺玫** *R. davurica* Pall.
- 100. 小叶 5—7, 卵形、椭圆形至倒卵形, 先端圆钝稀急尖, 下面有毛, 无腺点, 花白色; 果梨形或椭圆形, 熟时萼片脱落.....
- 25. **腺齿蔷薇** *R. albertii* Regel
- 99. 枝上只有皮刺, 无针刺或刺毛。
- 101. 叶片下面有毛或近于无毛。
- 102. 皮刺直细; 小叶 7—9, 长圆形或椭圆形, 先端圆钝或急尖, 下面近于无毛; 花粉红色, 花梗萼筒光滑或散生腺毛, 萼片先端延长成叶状, 全缘
- 36. **尖刺蔷薇** *R. oxyacantha* M. Bieb.
- 102. 皮刺宽扁; 小叶 7—11, 椭圆形至卵状长圆形, 先端急尖稀圆钝, 下面被柔毛; 花粉红色, 花梗萼筒密被腺毛, 萼片先端延长成叶状, 常有羽状裂片.....
- 41. **扁刺蔷薇** *R. sweginzowii* Koehne
- 101. 叶片下面有毛和腺。
- 103. 皮刺直细稀无刺; 小叶 9—11, 长圆形或椭圆卵形; 花单生或 2—3 朵; 花梗萼筒密被腺毛; 萼片先端延长成带状
- 44. **腺果大叶蔷薇** *R. macrophylla* Lindl. var. *glandulifera* Yü et Ku
- 103. 皮刺宽扁。
- 104. 小叶 7—11, 椭圆形至卵状长圆形, 先端圆钝; 花单生, 稀 2—3; 花梗萼筒密被腺毛; 萼片先端延长成叶状, 常有羽状裂片
- 41. **腺叶扁刺蔷薇** *R. sweginzowii* Koehne var. *glandulosa* Card.
- 104. 小叶 5—9, 椭圆形或卵形, 先端急尖或圆钝; 花数朵成伞房花序; 花梗萼筒密被腺毛; 萼片先端延长成叶状并有羽状裂片
- 28. **刺梗蔷薇** *R. setipoda* Hemsl. et Wils

Nat. Pflanzenfam. 3(3):47. 1888; Rehd. Man. Cult. Trees & Shrubs ed. 5.429. 1951. —
Rosa sect. *Eglanteriae* DC. in Ser. Mus. Helv. Hist. Nat. 1:3. 1818. p. p. — *Rosa* div.
Simplicifolia Lindl. Ros. Monogr. 1.1820. — *Rosa* groupe *Simplicifolia* Thory, Prodr. Mo-
 nogr. Ros. 33. 1920. — *Rosa* ser. *Pallasiana* Tratt. Ros. Monogr. 213. 1823. — *Hul-*
themia Dumort. Not. Nouv. Gen. Pl. 13. 1824; Juzep. in Fl. URSS 10:506. 1941. —
Lowea Lindl. in Bot. Reg. 15:t. 1261. 1829.

本亚属我国产 1 种。

1. 小葉叶蔷薇 单叶蔷薇(中国高等植物图鉴)

Rosa berberifolia Pall. in Nov. Act. Acad. Sci. Petrop. 10:379. t. 10(5). 1797.
 — *Hulthemia berberifolia* (Pall.) Dumort. Not. Nouv. Gen. Pl. 13. 1824; Ldb. Fl. Ross.
 2:78. 1844; Juzep. in Fl. URSS 10:506. 1941. — *Rosa persica* auct. non Michx. ex Juss.
 1789; 经济植物手册 1(2): 624. 1955; 中国高等植物图鉴 2: 244. 图 2217. 1972.

低矮铺散灌木,高 30—50 厘米;小枝嫩时黄色,光滑,老时暗褐色,粗糙,无毛;皮刺黄色,散生或成对生于叶片基部,弯曲或直立,有时混有腺毛。单叶,叶片椭圆形、长圆形、稀卵形,长 1—2 厘米,宽 5—10 毫米,先端急尖或圆钝,基部近圆形稀宽楔形,边缘有锯齿,近基部全缘,两面无毛或下面在幼时有稀疏短柔毛;无柄或近无柄;无托叶。花单生,直径 2—2.5 厘米;花梗长 1—1.5 厘米,无毛或有针刺;萼片披针形,先端尾尖或长渐尖,外面有短柔毛和稀疏针刺,内面有灰白色绒毛;萼筒外被长针刺;花瓣黄色,基部有紫红色斑点,倒卵形,比萼片稍长;雄蕊紫色,多数,着生在坛状花托口部的周围;心皮多数,花柱离生,密被长柔毛,比雄蕊短。果实近球形,直径约 1 厘米,紫褐色,无毛,密被针刺,萼片宿存。花期 5—6 月,果期 7—9 月。

产我国新疆。生于山坡、荒地或路旁干旱地区,海拔 120—550 米。苏联也有分布。

本种与分布在中亚、帕米尔、阿尔泰和伊朗等地的波斯蔷薇 *R. persica* Michx. ex Juss. 极为近似,惟后者小枝、皮刺和叶片均密被短柔毛,易于识别。

亚属 2. 蔷薇亚属——Subgen. *Rosa* ——Subgen. *Eurosa* Focke in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(3):47. 1888; Rehd. Man. Cult. Trees & Shrubs ed. 5. 430. 1951.

本亚属我国有以下 9 组。

组 1. 芹叶组——Sect. *Pimpinellifoliae* DC. ex Ser. Mus. Helv. Nat. Helv. 1:3. 1818; Lindl. Ros. Monogr. 36. 1820. p.p.; Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. 8:235. (Prim. Monogr. Rosa. 14) 1869; Rehd. et wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:343. 1915. Rehd. Man. Cult. Trees & Shrubs ed. 5. 430. 1951. — *Rosa* sect. *Eglanteriae* DC. ex Ser. l. c. 1818. — *Rosa* div. *Rubiginosae* Lindl. Ros. Monogr. 84. 1820. p.p. — *Rosa* groupe *Spinossissima* Thory, Prodr.