

单瓣黄色。为栽培黄刺玫的原始种。

产黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山东、山西、陕西、甘肃等省区。生向阳山坡或灌木丛中。

9. 樱草蔷薇(经济植物手册) 大马茄子(甘肃)

Rosa primula Bouleng. in Bull. Jard. Bot. Bruxell. **14**:121. 1936. — *R. xanthina* f. *normalis* Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. **2**:342. 1915. quoad. pl. cit. — *R. ecae* auct. non Ait. 1881: Mc Farland in Fl. & Silva **8**:242. f. 83. 1936.

直立小灌木,高1—2米;小枝圆柱形,细弱,无毛;散生直立稍扁而基部膨大的皮刺。小叶9—15,稀7,连叶柄长3—7厘米;小叶片椭圆形、椭圆倒卵形至长椭圆形,长6—15毫米,宽3—8毫米,先端圆钝或急尖,基部近圆形或宽楔形,边缘有重锯齿,两面均无毛,下面中脉突起,密被腺点;叶轴、叶柄有稀疏腺;托叶卵状披针形,大部贴生于叶柄,边缘有不明锯齿和腺,无毛。花单生于叶腋,无苞片;花梗长8—10毫米,无毛;花直径2.5—4厘米;萼筒、萼片外面无毛,萼片披针形,先端渐尖,全缘,内面有稀疏长柔毛;花瓣淡黄或黄白色,倒卵形,先端微凹,基部宽楔形;花柱离生,被长柔毛,比雄蕊短。果卵球形或近球形,直径约1厘米,红色或黑褐色,无毛,萼片反折宿存,果梗长可达1.5厘米。花期5—7月,果期7—11月。

产河北、河南、山西、甘肃、陕西、四川。多生山坡、林下、路旁或灌丛中,海拔1400—3450米。

本种与阿富汗黄刺玫 *R. ecae* Ait. 极为近似,惟本种小叶片较多9—15,边缘锯齿较密5—17,花色淡黄,直径3—4厘米。后者小叶片5—7(—9),边缘锯齿5—11,花色深黄,直径1.5—2厘米。可以区别。

10. 异味蔷薇

Rosa foetida Herrm. Diss. Bot.-Med. Rosa 18. 1762; Willmott, Gen. Ros. **2**:267. t. 1914. — *R. lutea* Mill. Gard. Dict. ed 8. **2**: no. 11. 1768; Curtis in Curtis's Bot. Mag. **11**: t. 363. 1979. — *R. eglanteria* auct. non L. 1753: L. Amoen Acad. **5**:220. 1760; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **2**:366. 1878.

10a. 异味蔷薇(原变形)

R. foetida Herrm. f. **foetida**

灌木,高1.5—3米;小枝细弱,红褐色,无毛;皮刺直立,基部有圆盘。小叶5—9,连叶柄长4—6厘米;小叶片宽卵形或倒卵形,先端急尖或截形,基部近圆形或宽楔形,边缘有重锯齿,上面暗绿色,有毛或近无毛,下面有稀疏柔毛和散生腺毛;小叶柄和叶轴有柔毛和腺毛;托叶大部贴生于叶柄,离生部分卵状披针形,先端渐尖,边缘有腺毛。花单生,稀数朵,无苞片;花梗长4—5厘米,无毛;花直径4—6厘米;萼片三角状披针形,先端叶状,全缘,外面有稀疏柔毛和腺毛,内面密被长柔毛,比萼筒长2倍;花瓣深黄色;雄蕊多数;花柱