

式标本采自四川康定大炮山。

本种小叶具有重锯齿，下面有时具腺，与腺叶扁刺蔷薇 *R. sweginzowii* Koehne var. *glandulosa* Card. 极为近似。但后者皮刺一般扁宽，叶片较大，花梗萼筒密被腺毛，萼片先端延长成叶状，有明显锯齿或羽裂片，花梗基部有明显苞片，可以识别。又由于本种花梗下不具苞片，使此两种分别属于不同组，扁刺蔷薇属于桂味组，而本种为芹叶组的成员之一。

13. 秦岭蔷薇 (秦岭植物志) 图版 58: 1—2

Rosa tsinglingensis Pax. et Hoffm. in Fedde, Repert. Nov. Sp. Beih. **12**:414. 1922; 秦岭植物志 **1**(2): 566. f. 472. 1974.

小灌木，高 2—3 米；小枝纤细，无毛；散生浅色皮刺，有时偶有针刺及腺毛。小叶通常 11—13，稀 9，连叶柄长 5—11 厘米；小叶片椭圆形或长圆形，长 1—2 厘米，宽 8—12 毫米，先端圆钝或急尖，基部近圆形或宽楔形，边缘有重锯齿或单锯齿，幼时齿尖带腺，上面无毛，叶脉下陷，下面无毛或近于无毛，常沿中脉有腺毛。叶轴叶柄有散生皮刺和腺毛；托叶大部贴生于叶柄，仅顶端部分离生，离生部分耳状，无毛，边缘具有腺齿。花单生于叶腋，无苞片；花梗长 1.5—2 厘米，无毛，有散生的腺毛；花直径 2.5—3 厘米；萼筒萼片外面无毛，萼片三角状披针形，先端叶状，全缘或有锯齿，内面密被柔毛；花瓣白色，倒卵形，基部楔形；雄蕊多数；花柱离生，稍伸出，密被柔毛。果倒卵圆形至长圆倒卵圆形，长 2—3 厘米，红褐色，有宿存直立萼片。花期 7—8 月，果期 9 月。

产陕西、甘肃。多生于桦木林下或灌丛中，海拔 2800—3700 米。模式标本采自太白山。

本种与细梗蔷薇 *R. graciliflora* Rehd. et Wils. 极为近似，甚至可合并为一种，惟本种小叶片常 13，花瓣白色，直径稍小，可以区别。


系 2. 四数花系——Ser. *Sericeae* (Crép.) Yü et Ku in Bull. Bot. Res. **1**(4):2. 1981. —Sect. *Sericeae* Crep. in Journ. Hort. Soc. Lond. **11**:226. 1889; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. **2**:343. 1915.

本系有下列 6 种。

14. 求江蔷薇 图版 59: 5—6

Rosa taronensis Yü et Ku, Bull. Bot. Res. **1**(4):6. 1981.

灌木，高 1—2.5 米；小枝圆柱形，常无毛，有基部膨大的皮刺和细密的针刺。小叶 7—9(—13)，连叶柄长 4—10 厘米；小叶片长圆形或长圆倒卵形，长 1—3 厘米，宽 5—12 毫米，先端截形，基部宽楔形或近圆形，边缘仅顶端的 1/3 或最多不超过 1/2 部分有锐锯齿，下半部全缘，上下两面均无毛或下面有时沿中脉稍有柔毛和小皮刺；小叶柄和叶轴无毛，有散生小皮刺；托叶宽，大部贴生于叶柄，离生部分卵形，先端尾尖，两面无毛，边缘有腺齿。花单生；无苞片；花梗短，长不超过 1.2 厘米，无毛；花直径 3.5—4 厘米；萼筒倒圆锥



1—2. 秦岭蔷薇 *Rosa tsinglingensis* Pax. et Hoffm.: 1. 花枝, 2. 果实。3—4. 长白蔷薇 *Rosa koreana* Kom.: 3. 花枝, 4. 果实。5. 玉山蔷薇 *Rosa morrisonensis* Hayata: 花枝。(马建生绘)