

絹毛薔薇變型檢索表

1. 小葉片下面被柔毛和腺毛。
 2. 小葉片下面僅被柔毛, 無腺毛。
 3. 皮刺小, 僅基部稍膨大……………17a. 原變型 f. *sericea*
 3. 皮刺寬、扁而大, 呈翼狀……………17b. 寬刺絹毛薔薇 f. *pteracantha* Franch.
 2. 小葉片下面被柔毛和腺毛……………17c. 腺葉絹毛薔薇 f. *glandulosa* Yü et Ku
1. 小葉片下面無毛或近無毛……………17d. 光葉絹毛薔薇 f. *glabrescens* Franch.

17b. 寬刺絹毛薔薇(變型)

R. sericea Lindl. f. **pteracantha** Franch. Pl. Delav. 220. 1890.

本變型主要特征小枝被寬扁大形皮刺; 小葉片下面被柔毛, 邊緣僅上半部有鋸齒。
產我國西藏。生山溝、干河谷或山坡灌叢中, 海拔 3000—4400 米。

17c. 腺葉絹毛薔薇(變型)

R. sericea Lindl. f. **glandulosa** Yü et Ku, 植物分類學報 18(4): 503. 1980.

本變型的主要特征小葉下面被腺毛和柔毛, 邊緣僅上半部有單鋸齒。
產我國西藏。生山坡灌叢中、河谷或林緣山麓, 海拔 2550—4200 米。

17d. 光葉絹毛薔薇(變型)

R. sericea Lindl. f. **glabrescens** Franch. Pl. Dalav. 220. 1890.

本變型主要特征小葉下面無毛或近無毛, 邊緣僅上半部有鋸齒。
產西藏。生山坡灌叢中或疏林中, 海拔 2600—3300 米。

18. 毛葉薔薇

Rosa mairei Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 11:299. 1912; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 13:319. 1932; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:528. 1933. Rehd. in Journ. Arn. Arb. 17:399. 1936.

矮小灌木, 高 1—2 米; 枝圓柱形, 粗壯, 常呈弓形彎曲, 幼嫩時被長柔毛, 逐漸脫落, 老時無毛, 散生扁平、翼狀皮刺, 有時密被針刺。小葉 5—9(—11), 連葉柄長 2—7 厘米, 小葉片長圓倒卵形或倒卵形, 有時有長圓形, 長 6—20 毫米, 寬 4—10 毫米, 先端圓鈍或截形, 基部楔形或近圓形, 邊緣上部 2/3 或 1/3 的部份有鋸齒, 兩面有絲狀柔毛, 下面更密, 沿葉脈被絲狀柔毛; 托葉貼生于葉柄, 離生部份卵形, 邊緣有齒或全緣, 有毛。花單生于葉腋, 無苞片; 花梗長 8—15 毫米, 有毛; 花直徑 2—3 厘米; 萼片卵形或披針形, 先端漸尖, 全緣, 外面有稀疏柔毛, 內面密被柔毛; 花瓣白色, 寬倒卵形, 先端凹凸不平, 基部楔形; 花柱離生, 有毛, 稍伸出萼筒口外, 比雄蕊短很多。果倒卵圓形, 直徑約 1 厘米, 紅色或褐色, 無毛, 萼片宿存, 直立或反折。 花期 5—7 月, 果期 7—10 月。

產四川、雲南、貴州、西藏。生山坡陽處或溝邊雜木林中, 海拔 2300—4180 米。

19. 川西薔薇 西康薔薇(植物分類學報) 圖版 59: 7—9