

Rosa setipoda Hemsl. et Wils. in Kew Bull. **1906**:158. 1906; Willmott, Gen. Ros. **1**:173. t. 55. 1911; Rolfe in Curtis's Bot. Mag. **140**: t. 8569. 1914; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. **2**:323. 1915; 秦岭植物志 **1**(2): 569. 1974. ———*R. macrophylla* var. *crasseculeata* Vilmorin in Journ. Hort. Soc. Lond. **27**:487. f. 135. 136. 1902-3. ———*R. hemsleyana* Täckholm in Acta Hort. Berg. **7**:150. 1922. ———*R. macrophylla* auct. non Lindl. 1820: Crép. in Bull. Soc. Bot. Ital. **1897**:231. 1897.

灌木，高可达3米；小枝圆柱形，微弓曲，无毛，散生宽扁皮刺，稀无刺。小叶5—9，连叶柄长8—19厘米；小叶片卵形、椭圆形或广椭圆形，长2.5—5.2厘米，宽1.2—3厘米，先端急尖或圆钝，基部近圆形或宽楔形，边缘有重锯齿，齿尖常带腺体，上面无毛，下面中脉和侧脉均突起，有柔毛和腺体；小叶柄和叶轴密被腺毛或有稀疏的小皮刺；托叶宽平，大部贴生于叶柄，离生部分耳状，三角状披针形，先端渐尖，边缘及下面有腺体。花为稀疏伞房花序，花序基部苞片2—3，苞片卵形，先端渐尖，边缘有不规则的齿和腺体，下面有明显网脉、柔毛和腺体；花梗长1.3—2.4厘米，被腺毛；花直径3.5—5厘米；萼片卵形，先端扩展成叶状，边缘具羽状裂片或有锯齿，齿尖带腺体，外面有腺毛，内面密被绒毛；花瓣粉红色或玫瑰紫色，宽倒卵形，外面微被柔毛；花柱离生，被柔毛，比雄蕊短很多。果长圆状卵球形，先端有短颈，直径1—2厘米，深红色，有腺毛或无腺毛，萼片直立宿存。花期5—7月，果期7—10月。

产湖北、四川。多生山坡或灌丛中，海拔1800—2600米。模式标本采自湖北房县。

本种叶片有重锯齿，齿尖有显著腺体，叶片、托叶、苞片下面均密被腺体，萼片常具羽状分裂，花梗、萼筒密被腺毛，易与他种区别。

29. 伞房蔷薇

Rosa corymbulosa Rolfe in Curtis's Bot. Mag. **140**: t. 8566. 1914; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. **2**:323. 1915; 秦岭植物志 **1**(2): 568. 1974.

小灌木，高1.3—2米；小枝圆柱形，直立或稍弯曲，无毛，无刺或有散生小皮刺。小叶3—5，稀7，连叶柄长5—13厘米；小叶片卵状长圆形或椭圆形，长2.5—6厘米，宽1.5—3.5厘米，先端急尖或圆钝，基部楔形或近圆形，边缘有重锯齿或单锯齿，上面深绿色，无毛，下面灰白色，有柔毛，沿中脉和侧脉较密；小叶柄和叶轴有稀疏短柔毛和腺毛，有散生小皮刺；托叶扁平，大部贴生于叶柄，离生部分卵形，边缘有腺毛。花多朵或数朵，排列成伞形的伞房花序，稀单生；苞片卵形或卵状披针形，先端长渐尖，边缘有腺毛；花梗长2—4厘米，有柔毛和腺毛；花直径2—2.5厘米；萼片卵状披针形，先端扩展成叶状，全缘或有不明显锯齿和腺毛，内外两面均有柔毛，内面较密；花瓣红色，基部白色，宽倒心形，先端有凹缺，比萼片短；花柱密被黄白色长柔毛，与雄蕊近等长或稍短。果近球形或卵球形，直径约8毫米，猩红色或暗红色，萼片直立宿存。花期6—7月，果期8—10月。

产湖北、四川、陕西、甘肃。多生于灌丛中、山坡、林下或河边等处，海拔1600—2000

米。模式标本采自湖北兴山。

本种近似刺梗蔷薇 *R. setipoda* Hemsl. et Wils., 但本种叶片边缘为单锯齿或重锯齿, 下面有毛而无腺体, 萼片全缘, 很少有不规则分裂, 花柱外伸与雄蕊近等长; 果实近球形, 易于区别。

30. 尾萼蔷薇(经济植物手册)

Rosa caudata Baker in Willmott, Gen. Ros. 2:495. 1914; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:321. 1915.

30a. 尾萼蔷薇(原变种)

R. caudata Baker var. *caudata*

灌木, 高可达 4 米; 小枝圆柱形, 开展, 无毛, 有散生、直立、肥厚三角形皮刺。小叶 7—9, 连叶柄长 10—20 厘米; 小叶片卵形、长圆状卵形或椭圆卵形, 长 3—7 厘米, 宽 1—3 厘米, 先端急尖或短渐尖, 基部圆形或宽楔形, 边缘有单锯齿, 上下两面无毛或下面沿脉有稀疏短柔毛, 中脉和侧脉均突起; 小叶柄和叶轴无毛, 有散生腺毛和小皮刺; 托叶宽平, 大部贴生于叶柄, 离生部分卵形, 先端渐尖, 全缘, 有或无腺毛。花多朵成伞房状, 有数个苞片, 苞片卵形, 先端尾尖, 边缘有腺体或无腺体; 花梗长 1.5—4 厘米, 无毛, 密被腺毛或完全无腺; 花直径 3.5—5 厘米; 萼筒长圆形, 密被腺毛或近光滑, 萼片长可达 3 厘米, 三角状卵形, 先端伸展成叶状, 全缘, 外面无毛, 内面密被短柔毛; 花瓣红色, 宽倒卵形, 先端微凹, 基部宽楔形; 花柱离生, 被柔毛。果长圆形, 长 2—2.5 厘米, 桔红色; 萼片常直立宿存。花期 6—7 月, 果期 7—11 月。

产湖北、四川、陕西。生山坡或灌丛中, 海拔 1650—2000 米。

30b. 大花尾萼蔷薇(变种)

R. caudata Baker var. *maxima* Yü et Ku in Bull. Bot. Res. 1(4): 8. 1981.

本变种与原变种的异点, 在其叶片花朵均较大, 小叶片长 8—10 厘米, 宽 4—6 厘米; 伞房花序有花 8—10 朵, 花直径 4—6 厘米, 花瓣外被丝毛, 萼片比花瓣长约 1 倍, 先端叶状有显明锯齿, 引人注目。

产陕西(沟场)、四川(天全)。生阳坡山沟林下, 海拔 1250—2450 米。

31. 西北蔷薇(中草药汇编) 山刺玫(秦岭植物志) 万朵刺、花别刺(陕西)

Rosa davidii Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. 13:253. 1874; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2: 322. 1915; Rolfe in Curtis's Bot. Mag. 142: t. 8679. 1916; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 5:205. 1924. 秦岭植物志 1(2): 568. 1974.

31a. 西北蔷薇(原变种)

R. davidii Crép. var. *davidii*

灌木, 高 1.5—3 厘米; 小枝圆柱形, 开展, 细弱, 无毛, 刺直立或弯曲, 通常扁而基部膨大。小叶 7—9, 稀 11 或 5, 连叶柄长 7—14 厘米; 小叶片卵状长圆形或椭圆形, 长 2.5—