

上面深绿色,无毛,下面灰绿色,沿脉有柔毛或近无毛,中脉和侧脉均突起;叶轴上有柔毛和稀疏小皮刺;托叶宽大,约 $2/3$ 部分贴生于叶柄,离生部分耳状,卵形,先端急尖,全缘,近无毛。花单生,稀 2 朵,苞片宽大,1—2 枚,卵状披针形,长 1.5—3 厘米,先端尾状;花梗长 1.5—2.5 厘米,无毛或有稀疏腺毛;花直径 3.5—5 厘米;萼片卵状披针形,先端明显伸展成叶状,比花瓣长 $1/3$ 或 $1/2$,全缘或有时先端有稀疏锯齿,外面近无毛,内面密被柔毛,边缘较密;花瓣红色,倒卵形;花柱离生,密被柔毛,比雄蕊短很多。果卵球形,直径 1.5—2 厘米,硃红色。花期 6 月,果期 7—10 月。

产湖北、四川、浙江。多生山坡,灌丛中或水沟旁等处,海拔 2200—2400 米。

本种与拟木香 *R. banksiopsis* Baker 极近似,但后者小叶片 7—9,长圆形,有花多朵形成伞房花序,花朵较小,直径 2—3 厘米,粉红色,可以区别。

38b. 腺叶大红蔷薇(变种)

Rosa saturata Baker var. *glandulosa* Yü et Ku in Bull. Bot. Res. 1(4):9. 1981.

本变种与原变种的异点,在其小叶边缘有部分为重锯齿,齿尖有腺,叶片下面满布腺点。

产四川(宝兴)。

39. 美蔷薇(经济植物手册) 油瓶子(河北)

Rosa bella Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:341. 1915; Hu et Chun, Icon. Pl. Sin. 2: pl. 79. 1929; 中国高等植物图鉴 2: 248. 图 2226. 1972; 内蒙古植物志 3: 61. 图版 31. 图 1—4. 1977. — *R. bella* f. *pallens* Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:342. 1915.

39a. 美蔷薇(原变种)

R. bella Rehd. et Wils. var. *bella*

灌木,高 1—3 米;小枝圆柱形,细弱,散生直立的基部稍膨大的皮刺,老枝常密被针刺。小叶 7—9,稀 5,连叶柄长 4—11 厘米;小叶片椭圆形、卵形或长圆形,长 1—3 厘米,宽 6—20 毫米,先端急尖或圆钝,基部近圆形,边缘有单锯齿,两面无毛或下面沿脉有散生柔毛和腺毛;小叶柄和叶轴无毛或有稀疏柔毛,有散生腺毛和小皮刺;托叶宽平,大部贴生于叶柄,离生部分卵形,先端急尖,边缘有腺齿,无毛。花单生或 2—3 朵集生,苞片卵状披针形,先端渐尖,边缘有腺齿,无毛;花梗长 5—10 毫米,花梗和萼筒被腺毛;花直径 4—5 厘米;萼片卵状披针形,全缘,先端延长成带状,外面近无毛而有腺毛,内面密被柔毛,边缘较密;花瓣粉红色,宽倒卵形,先端微凹,基部楔形;花柱离生,密被长柔毛,比雄蕊短很多。果椭圆状卵球形,直径 1—1.5 厘米,顶端有短颈,猩红色,有腺毛,果梗可达 1.8 厘米。花期 5—7 月,果期 8—10 月。

产吉林、内蒙古、河北、山西、河南等省区。多生灌丛中,山脚下或河沟旁等处,海拔可达 1700 米。