

花可提取芳香油并制玫瑰酱。花果均入药,花能理气、活血、调经、健胃;果能养血活血,据说能治脉管炎、高血压、头晕等症。河北、山西用本种果实代金樱子入药。

39b. 光叶美蔷薇 (变种)

Rosa bella Rehd. et Wils. var. *nuda* Yü et Tsai in Bull. Fam. Mem. Inst. Biol. Bot. ser. 7:114. 1936.

本变种与原变种之异点,在其花略较小,萼筒和花梗平滑而无腺刺。

产陕西(终南山)、河南(嵩山)。

40. 城口蔷薇 图版 63: 1—3

Rosa chengkouensis Yü et Ku in Bull. Bot. Res. 1(4):9. 1981.

灌木,高 1.5—2 米;小枝圆柱形,细弱,有稀疏或成对的直立皮刺。小叶通常 5,稀 7,连叶柄长 5—8 厘米;小叶片椭圆形,长圆形或卵形,长 1.5—3.2 厘米,宽 1—1.8 厘米,先端急尖或圆钝,基部宽楔形或近圆形,边缘有重锯齿,齿尖常带腺,上面暗绿色,无毛,下面灰绿色,有散生柔毛和腺点,网脉明显突起;小叶柄和叶轴有柔毛,腺毛和小皮刺;托叶大部贴生于叶柄,离生部分卵形或卵状披针形,先端急尖,边缘和外面密被腺毛。花单生,苞片卵状披针形,先端长渐尖,边缘有腺毛;花梗长 1.5—3 厘米,有腺毛,花直径 2.5—3 厘米;萼片长圆状披针形,先端扩展成叶状,全缘而有腺毛,内外两面密被柔毛,萼筒卵形至长圆形,外面被腺毛;花瓣粉红色,宽倒卵形,先端微凹,基部楔形,约与萼片等长;花柱离生,稍伸出,密被白色柔毛。果卵球形或倒卵球形,直径 7—8 毫米,暗红色,有稀疏腺毛;萼片直立,宿存。花期 5—6 月,果期 8—10 月。

产四川(城口、巫溪)。生灌木林中或河岸边,海拔 1300—2100 米。

本种近似伞房蔷薇 *R. corymbulosa* Rolfe,惟后者花序有花数朵,成伞房花序,很少单生;叶片较大,叶边单锯齿间有部分重锯齿,叶片下面有毛或无毛,不具显明腺毛,易于区别。

41. 扁刺蔷薇 (秦岭植物志) 油瓶子、野刺玫 (陕西)

Rosa sweginzowii Koehne in Fedde, Repert. Sp. Nov. 8:22. 1910, et 11:531. f. 3. 1913; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:324. 1915; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:527 1933; 秦岭植物志 1(2): 570. 图 473. 1974.

41a. 扁刺蔷薇 (原变种) 图版 64: 3—4

R. sweginzowii Koehne var. *sweginzowii*

灌木,高 3—5 米;小枝圆柱形,无毛或有稀疏短柔毛,有直立或稍弯曲,基部膨大而扁平皮刺,有时老枝常混有针刺。小叶 7—11,连叶柄长 6—11 厘米;小叶片椭圆形至卵状长圆形,长 2—5 厘米,宽 8—20 毫米,先端急尖稀圆钝,基部近圆形或宽楔形,边缘有重锯齿,上面无毛,下面有柔毛或至少沿脉有柔毛,中脉和侧脉均突起;小叶柄和叶轴有柔毛、腺毛和散生小皮刺;托叶大部贴生于叶柄,离生部分卵状披针形,先端渐尖,边缘有腺齿。