

花单生,或2—3朵簇生,苞片1—2,卵状披针形,先端尾尖,下面中脉明显,边缘有带腺锯齿,有时有羽状裂片;花梗长1.5—2厘米,有腺毛;花直径3—5厘米;萼片卵状披针形,先端浅裂扩展成叶状,或有时羽状分裂,外面近无毛,有腺或无腺,内面有短柔毛,边缘较密;花瓣粉红色,宽倒卵形,先端微凹,基部宽楔形;花柱离生,密被柔毛,比雄蕊短很多。果长圆形或倒卵状长圆形,先端有短颈,长1.5—2.5厘米,宽1—1.7厘米,紫红色,外面常有腺毛,萼片直立宿存。花期6—7月,果期8—11月。

产云南、四川、湖北、陕西、甘肃、青海、西藏等省区。生山坡路旁或灌丛中,海拔2300—3850米。模式标本采自甘肃。

本种叶片边缘有重锯齿与刺毛蔷薇 *R. setipoda* Hemsl. et Wils. 相近似,但后者一般皮刺较少,叶片较大,叶片下面柔毛较少,常有腺体,花序伞房状有多朵花,萼片先端常有羽状裂片,花瓣外面被柔毛,可以区别。

41b. 腺叶扁刺蔷薇(变种)

***R. sweginzowii* Koehne var. *glandulosa* Card. in Lecomte, Not. Syst. 3:269. 1914.**

本变种与原变种的异点,在其小叶下面密被有柄腺体,花梗较长,2—3厘米,密被柔毛,萼片先端延长,有时具明显羽状裂片。

产甘肃、四川、云南、西藏。生松林边或灌木丛中,海拔2300—3800米。模式标本采自四川城口。

42. 华西蔷薇(拉汉种子植物名称) 穆氏蔷薇(经济植物手册),红花蔷薇(中国高等植物图鉴)

***Rosa moyesii* Hemsl. et Wils. in Kew Bull. 1906:159. 1906; Hemsl. in Curtis's Bot. Mag. 136: t. 8338. 1910; Willmott, Gen. Ros. 1:229. t. 1911; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 527. 1933; 中国高等植物图鉴 2: 248. 图 2225. 1972.**

42a. 华西蔷薇(原变种)

R. moyesii* Hemsl. var. *moyesii

灌木,高1—4米;小枝圆柱形,无毛或有稀疏短柔毛,有直立或稍弯曲、扁平而基部稍膨大皮刺,稀无刺。小叶7—13,连叶柄长7—13厘米;小叶片卵形、椭圆形或长圆状卵形,长1—5厘米,宽8—25毫米,先端急尖或圆钝,基部近圆形或宽楔形,边缘有尖锐单锯齿,上面无毛,下面中脉和侧脉均突起,沿脉有柔毛;小叶柄和叶轴有短柔毛、腺毛和散生小皮刺;托叶宽平,大部贴生于叶柄,离生部分长卵形,先端急尖,无毛,边缘有腺齿。花单生或2—3朵簇生;苞片1或2枚,长圆卵形,长可达2厘米,先端急尖或渐尖,边缘有腺齿;花梗长1—3厘米,花梗和萼筒通常有腺毛,稀光滑;花直径4—6厘米;萼片卵形,先端延长成叶状而有羽状浅裂,外面有腺毛,内面被柔毛;花瓣深红色,宽倒卵形,先端微凹不平,基部宽楔形;花柱离生,被柔毛,比雄蕊短。果长圆卵球形或卵球形,直径1—2厘米,先端有短颈,紫红色,外面有腺毛,萼片直立宿存。花期6—7月,果期8—10月。