

Ros. Monogr. 97. 1820. p. p. — *Rosa ser. Smithiana* Tratt. Ros. Monogr. 1:88. 1823.

本组 3 种产我国,世界各国引种栽培,已有大量园艺品种。

月季组分种检索表

1. 常绿或落叶灌木,小叶 3 或 5;托叶边缘有腺毛;花红色、粉红色稀白色,通常 4—5 朵稀单生,微香或无香;萼片常有羽裂片,稀全缘;果卵球形或梨形。…………… 55. 月季花 *R. chinensis* Jacq.
1. 常绿或半常绿藤本;托叶边缘无腺或仅在游离部分有腺。
 2. 小枝有稀疏钩状皮刺;小叶 5—7;花单生或 2—3 朵,粉色、黄色或白色,直径 5—10 厘米,很香,萼片大部分全缘,稀有羽裂片;果实扁球形…………… 56. 香水月季 *R. odorata* Sweet
 2. 小枝上除皮刺外,有时密被刺毛;小叶 3(—5);花单生,紫红色,直径 3—3.5 厘米,萼片全缘,稀有缺刻;果实梨形或倒卵球形…………… 57. 亮叶月季 *R. lucidissima* Lévl.

55. 月季花(群芳谱) 月月红(江苏浙江),月月花(四川)

Rosa chinensis Jacq. Obs. Bot. 3:7. t. 55. 1768; Willmott, Gen. Ros. 1:79. 1911; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:320. 1915; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:527. 1933; 广州植物志 297. 图 152. 1956; 江苏南部种子植物手册 357. 1959; Vidal in Fl. Camb. Laos et Vietn. 6:142. 1968 et in Fl. Thailand 2(1):65. 1970; 中国高等植物图鉴 2: 252. 图 2233. 1972; 秦岭植物志 1(2): 571. 1974; 内蒙古植物志 3: 63. 图版 31. 图 5—6. 1977. — *R. sinica* L. Syst. Veg. ed. 13. 394. 1774. — *R. nankinensis* Lour. Fl. Cochinch. 324. 1790. — *R. indica* auct. non L. 1753; Lour. Fl. Cochinch. 323. 1790; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2:364. 1878.

55a. 月季花(原变种) 图版 67: 4—7

R. chinensis Jacq. var. ***chinensis***

直立灌木,高 1—2 米;小枝粗壮,圆柱形,近无毛,有短粗的钩状皮刺或无刺。小叶 3—5,稀 7,连叶柄长 5—11 厘米,小叶片宽卵形至卵状长圆形,长 2.5—6 厘米,宽 1—3 厘米,先端长渐尖或渐尖,基部近圆形或宽楔形,边缘有锐锯齿,两面近无毛,上面暗绿色,常带光泽,下面颜色较浅,顶生小叶片有柄,侧生小叶片近无柄,总叶柄较长,有散生皮刺和腺毛;托叶大部贴生于叶柄,仅顶端分离部分成耳状,边缘常有腺毛。花几朵集生,稀单生,直径 4—5 厘米;花梗长 2.5—6 厘米,近无毛或有腺毛,萼片卵形,先端尾状渐尖,有时呈叶状,边缘常有羽状裂片,稀全缘,外面无毛,内面密被长柔毛;花瓣重瓣至半重瓣,红色、粉红色至白色,倒卵形,先端有凹缺,基部楔形;花柱离生,伸出萼筒口外,约与雄蕊等长。果卵球形或梨形,长 1—2 厘米,红色,萼片脱落。花期 4—9 月,果期 6—11 月。

原产中国,各地普遍栽培。园艺品种很多。

花、根、叶均入药。花含挥发油、槲皮苷鞣质、没食子酸、色素等,治月经不调、痛经、痢疳肿毒。叶治跌打损伤。鲜花或叶外用,捣烂敷患处。

55b. 单瓣月季花(变种)