

R. chinensis Jacq. var. **spontanea** (Rehd. et Wils.) Yü et Ku, stat. nov. — *R. chinensis* Jacq. f. *spontanea* Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:320. 1915.

本变种枝条圆筒状,有宽扁皮刺,小叶片3—5,花瓣红色,单瓣,萼片常全缘,稀具少数裂片。

产湖北、四川、贵州。此为月季花原始种。

55c. 紫月季花(变种)

R. chinensis Jacq. var. **semperflorens** (Curtis) Koehne, Deuts. Dendr. 281. 1893; Byhouwer in Journ. Arn. Arb. 10:97. 1929; 秦岭植物志 1(2): 572. 1974. — *R. semperflorens* Curtis in Bot. Mag. 8:t. 284. 1794

本变种枝条纤细,有短皮刺;小叶5—7,较薄,常带紫红色;花大部单生或2—3朵,深红色或深紫色,重瓣,有细长花梗。

Metcalf 发表福建蔷薇 *Rosa fukienensis* Metc. in Journ. Arn. Arb. 21:274. 1940. 直立灌木,具有小叶5片,无毛;花多朵呈伞房状圆锥花序,萼片披针形有羽状裂片,花柱外伸,离生,被柔毛,果实近球形,直径约7毫米,无毛。产福建,具体地点不详,钟心煊采6425。是否应属本组,有待研究确定。

56. 香水月季(中国树木分类学) 黄鹂(植物名实图考), 芳香月季(中国高等植物图鉴)

Rosa odorata (Andr.) Sweet, Hort. Suburb. Lond. 119. 1818; 广州植物志 296. 1956; Vidal in Fl. Camb. Laos et Vietn. 6:144. 1968 et in Fl. Thailand 2(1): 65. 1970; 中国高等植物图鉴 2: 251. 图 2232. 1972. — *R. indica odorata* Andr. Roses, 2:t. 77. 1810. — *R. indica fragrans* Thory in Redoute Ros. 1:61. t. 19. 1817. — *R. odoratissima* Sweet ex Lindl. Ros. Monogr 106. 1820. pro syn. — *R. thea* Savi, Fl. Ital. 2:t. 47. 1822. — *R. gechoutangensis* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 11:299. 1912. — *R. oulengensis* Lévl. l. c. 1912; Willmott, Gen. Ros. 2:523. t. 1914. — *R. tongchouanensis* Lévl. l. c. 11:300. 1912; Willmott, Gen. Ros. 2:523. t. 1914.

56a. 香水月季(原变种)

R. odorata (Andr.) Sweet var. **odorata**

常绿或半常绿攀援灌木,有长匍匐枝,枝粗壮,无毛,有散生而粗短钩状皮刺。小叶5—9,连叶柄长5—10厘米;小叶片椭圆形、卵形或长圆卵形,长2—7厘米,宽1.5—3厘米,先端急尖或渐尖,稀尾状渐尖,基部楔形或近圆形,边缘有紧贴的锐锯齿,两面无毛,革质;托叶大部贴生于叶柄,无毛,边缘或仅在基部有腺,顶端小叶片有长柄,总叶柄和小叶柄有稀疏小皮刺和腺毛。花单生或2—3朵,直径5—8厘米;花梗长2—3厘米,无毛或有腺毛;萼片全缘,稀有少数羽状裂片,披针形,先端长渐尖,外面无毛,内面密被长柔毛;花瓣芳香,白色或带粉红色,倒卵形;心皮多数,被毛;花柱离生,伸出花托口外,约与雄蕊等