

产云南(丽江)。

57. 亮叶月季

Rosa lucidissima Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **9**: 444. 1911, et Fl. Kouy-Tcheou, 354. 1915. P. P.; Willmott, Gen. Ros. **2**:519. t. 1914; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **13**:316. 1932, et **18**:257. 1937; Bouleng. in Bull. Jard. Bot. Bruxell. **14**:197. 1936. pro syn. sub *R. laevigata* Michx. — *R. boisii* Card. in Lecomte, Not. Syst. **3**:268. 1914. — *R. lucidissima* Lévl. f. *setosa* Card. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris **23**:125. 1917. — *R. anemonoides* (*R. laevigata* × *R. odorata*) Rehd. in Journ. Arn. Arb. **3**:13. 1922.

常绿或半常绿攀援灌木;小枝粗壮,老枝无毛,有基部压扁的弯曲皮刺,有时密被刺毛。小叶通常3,极稀为5;连叶柄长6—11厘米;小叶片长圆状卵形或长椭圆形,长4—8厘米,宽2—4厘米,先端尾状渐尖或急尖,基部近圆形或宽楔形,边缘有尖锐或紧贴锯齿,两面无毛,老时常呈紫褐色,上面颜色深绿,有光泽,下面苍白色;顶生小叶柄较长,侧生小叶柄短,总叶柄有小皮刺和稀疏腺毛;托叶大部贴生,仅顶端分离,无毛,游离部分披针形,边缘有腺。花单生,直径3—3.5厘米,花梗短,长6—12毫米,花梗和萼筒无毛或幼时微有短柔毛,稀有腺毛,无苞片;萼片与花瓣近等长,长圆状披针形,先端尾状渐尖,全缘或稍有缺刻,外面近无毛,有时有腺,内面密被柔毛,花后反折;花瓣紫红色,宽倒卵形,顶端微凹,基部楔形;雄蕊多数,着生在坛状花托口周围的突起花盘上;心皮多数,被毛,花柱紫红色,离生,比雄蕊稍短。果实梨形或倒卵球形,常呈黑紫色,平滑,果梗长5—10毫米。花期4—6月,果期5—8月。

产湖北、四川、贵州。多生于山坡杂木林中或灌丛中。海拔400—1400米。模式标本采自贵州平坝。

本种多具3小叶,近似金樱子 *R. laevigata* Michx., 但托叶大部分贴生于叶柄,花红色,果实无刺毛,易于区别。芮德(A. Rehder)认为系金樱子与香水月季的杂交种并命名为 *R. anemonoides* Rehd., 从植株形态看确比较接近香水月季,但小叶多3片,花紫红色,果实梨形或倒卵形,特征介于月季花与香水月季之间,有人认为本种是月季花的原始类型 *R. chinensis* Jacq. f. *spontanea* Rehd. et Wils. 不为无因。Cardot 曾将模式标本命名为刺毛变型 *R. lucidissima* Lévl. f. *setosa* Card., 蔷薇属有些种仅具皮刺,有些种皮刺之外,兼具针刺和刺毛,似无另立变型之必要,故合并如上。

组5.合柱组——Sect. *Synstylae* DC. Cat. Hort. Monspel. 137. 1813; Lindl. Ros. Monogr. 111. 1820; DC. ex Ser. Mus. Helv. Hist. Nat. **1**:2. 1818; Ser. in DC. Prodr. **2**: 597. 1825; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. **2**:334. 1915; Rehd. Man. Cult. Trees & Shrubs ed. 5. 445. 1951. — *Rosa* groupe *Floridæ* Thory, Prodr. Monogr. Ros. **35**. 1820. — *Rosa* div. *Systylæ* Lindl. Ros. Monogr. 111. 1820. — *Rosa* ser. *Willdenowiana* Tratt.

Ros. Monogr. 2:94. 1823. — *Rosa* gruppe *Corymbiferae* K. Koch. Dendr. 264. 1869.

本组主要产亚洲,少数见于南欧、北非。我国产18种。分为以下两系。

合柱组分种检索表

1. 托叶篦齿状或有不规则锯齿。(齿裂托叶系 Ser. Multiflorae Yü et Ku)
 2. 小叶7—9, 稀5, 不为披针形。
 3. 托叶篦齿状; 小叶下面被短柔毛或两面被毛; 花柱无毛。
 4. 花多朵, 成圆锥状花序; 小叶片长1.5—5厘米, 仅下面被稀疏柔毛……………58. 野蔷薇 *R. multiflora* Thunb.
 4. 花单生; 小叶片长不超过1厘米, 两面被柔毛……………59. 单花合柱蔷薇 *R. uniflora* Yü et Ku
 3. 托叶有不规则的锯齿, 稀为篦齿状。
 5. 小叶下面密被长柔毛, 沿叶脉更密; 花柱有毛。
 6. 花白色, 直径1.5—2厘米, 成顶生伞房状花序; 花梗和萼筒密被柔毛和腺毛; 小叶上面沿中脉有毛……………60. 广东蔷薇 *R. kwangtungensis* Yü et Tsai
 6. 花粉红色, 直径2.5—3厘米, 成伞形伞房状花序; 花梗和萼筒光滑无毛或有少数腺毛; 小叶上面无毛……………61. 丽江蔷薇 *R. lichiangensis* Yü et Ku
 5. 小叶下面无毛或近于无毛。
 7. 花柱被毛; 小叶5—9, 长1—3厘米, 先端圆钝或急尖……………62. 光叶蔷薇 *R. wichuraiana* Crép.
 7. 花柱无毛; 小叶(5—)7—9, 长1.5—3(—6)厘米, 先端急尖或渐尖; 花白色或粉红色, 直径3—3.5厘米……………63. 伞花蔷薇 *R. maximowicziana* Regel
 2. 小叶大多数为3, 卵状披针形, 无毛, 下面苍白色; 托叶有不规则锯齿; 花粉红色, 直径2—2.5厘米……………64. 银粉蔷薇 *R. anemoniflora* Fort.
 1. 托叶全缘, 常有腺毛(全缘托叶系 Ser. Brunonianae Yü et Ku)
 8. 小叶两面被毛或仅下面被毛。
 9. 小叶长圆形或长圆状披针形, 两面被柔毛, 下面较密; 小枝密被柔毛; 花多朵排成复伞房花序, 花直径3—5厘米……………65. 复伞房蔷薇 *R. brunonii* Lindl.
 9. 小叶卵状椭圆形、长圆形或长圆倒卵形, 仅下面被柔毛; 小枝有毛或无毛; 花多朵成伞房状或伞形伞房状花序, 花直径1.5—4厘米。
 10. 小叶下面叶脉突起, 密被灰白色柔毛, 叶质地较厚, 上面有显明褶皱……………66. 绣球蔷薇 *R. glomerata* Rehd. et Wils.
 10. 小叶下面有稀疏柔毛或沿脉较密, 叶质地较薄, 上面无褶皱。
 11. 小叶通常5, 稀7, 卵状椭圆形至倒卵形, 长3—6厘米, 先端尾状渐尖, 下面全部被短柔毛; 萼片披针形, 通常全缘……………67. 悬钩子蔷薇 *R. rubus* Lévl. et Vant.
 11. 小叶7—9, 长圆卵形至卵状披针形, 长2.5—4.5厘米, 先端短渐尖或急尖, 下面沿脉被短柔毛; 萼片卵状披针形, 边缘常有羽裂片……………68. 卵果蔷薇 *R. helenae* Rehd. et Wils.
 8. 小叶片两面无毛或下面仅沿脉微有柔毛。
 12. 小叶片革质, 有光泽, 下面叶脉明显, 无毛或稍有柔毛; 花瓣外面有绢毛。
 13. 小叶片7—9, 长3—7厘米, 宽1—3.5厘米; 萼片长0.8—1.2厘米, 两面有稀疏柔毛; 花排成伞房状花序……………69. 长尖叶蔷薇 *R. longicuspis* Bertol.
 13. 小叶片3—5, 长7—12厘米, 宽3—6厘米; 萼片长1.5—2厘米, 两面密被柔毛; 花排成复伞

- 房状花序..... 70. 毛萼蔷薇 *R. lasiosepala* Metc.
12. 小叶片不呈革质, 无光泽; 花瓣外面无毛。
14. 小叶 5—9, 通常 7。
15. 小叶片大, 长 4—7 厘米, 下面有腺; 花多朵成复伞房状或圆锥状花序, 花梗细, 长 2—3 厘米..... 71. 腺梗蔷薇 *R. filipes* Rehd. et Wils.
15. 小叶片较小, 长 1—3 厘米, 下面无腺; 花为伞房花序, 稀单生, 花梗长不到 1 厘米..... 72. 川滇蔷薇 *R. soulieana* Crép.
14. 小叶 3—5。
16. 小叶片大, 长 3.5—9 厘米, 下面无腺, 边缘为单锯齿 73. 软条七蔷薇 *R. henryi* Bouleng.
16. 小叶片较小, 长不超过 2.5 厘米, 下面有腺, 边缘为重锯齿。
17. 小叶片长 8—15 毫米, 先端圆钝或截形; 花单生或 2—3 朵集生..... 74. 重齿蔷薇 *R. duplicata* Yü et Ku
17. 小叶片长 1.2—2.5 厘米, 先端急尖或短渐尖, 花多朵成伞房状花序..... 75. 维西蔷薇 *R. weisiensis* Yü et Ku

系 6. 齿裂托叶系——Ser. Multiflorae Yü et Ku in Bull. Bot. Res. 1(4):4. 1981.

本系有下列 7 种。

58. 野蔷薇(群芳谱) 墙藦(神农本草经), 刺花(本草纲目), 营实墙藦(植物名实图考), 多花蔷薇(华北习见观赏植物), 蔷薇(江苏南部种子植物手册)

Rosa multiflora Thunb. Fl. Jap. 214. 1784; Hook. f. in Curtis's Bot. Mag. 116:t. 7119. 1890; Willmott, Gen. Ros. 1:23. t. 1911; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:304. 1915; 广州植物志 294. 1956; 江苏南部种子植物手册 358. 1959; Ohwi, Fl. Jap. 541. 1965; 中国高等植物图鉴 2: 249. 图2228. 1972.

58a. 野蔷薇(原变种)

R. multiflora Thunb. var. *multiflora*

攀援灌木; 小枝圆柱形, 通常无毛, 有短、粗稍弯曲皮刺。小叶 5—9, 近花序的小叶有时 3, 连叶柄长 5—10 厘米; 小叶片倒卵形、长圆形或卵形, 长 1.5—5 厘米, 宽 8—28 毫米, 先端急尖或圆钝, 基部近圆形或楔形, 边缘有尖锐单锯齿, 稀混有重锯齿, 上面无毛, 下面有柔毛; 小叶柄和叶轴有柔毛或无毛, 有散生腺毛; 托叶篦齿状, 大部贴生于叶柄, 边缘有或无腺毛。花多朵, 排成圆锥状花序, 花梗长 1.5—2.5 厘米, 无毛或有腺毛, 有时基部有篦齿状小苞片; 花直径 1.5—2 厘米, 萼片披针形, 有时中部具 2 个线形裂片, 外面无毛, 内面有柔毛; 花瓣白色, 宽倒卵形, 先端微凹, 基部楔形; 花柱结合成束, 无毛, 比雄蕊稍长。果近球形, 直径 6—8 毫米, 红褐色或紫褐色, 有光泽, 无毛, 萼片脱落。

产江苏、山东、河南等省。日本、朝鲜习见。

本种变异性强, 常见庭园栽培有以下变种。