

采自广东鼎湖山。

本种与多花蔷薇 *R. multiflora* Thunb. 极为近似,但后者托叶为明显篦齿状分裂,花柱无毛,易于区别。

60b. 毛叶广东蔷薇 (变种)

R. kwangtungensis Yü et Tsai var. *mollis* Metc. in Journ. Arn. Arb. **21**:111. 1940.

本变种的特点为在花梗和萼片上密被绒毛状柔毛,小叶和叶轴上密被长柔毛,花重瓣。

产广东、广西、福建(厦门)。可能由栽培逸为野生。

60c. 重瓣广东蔷薇 (变种)

Rosa kwangtungensis Yü et Tsai var. *plena* Yü et Ku in Bull. Bot. Res. **1**(4):13. 1981.

本变种花重瓣,直径 2.5—3 厘米,花柱外伸,有长柔毛;托叶有显明锯齿。可能系经栽培后的变种。

产福建仓前山,广东鼎湖山有栽培。

61. 丽江蔷薇

Rosa lichiangensis Yü et Ku in Bull. Bot. Res. **1**(4):14. 1981.

攀援小灌木,高约 2 米;小枝圆柱形,细弱,散生短粗、稍弯曲的皮刺。小叶 3—5,连叶柄长 3—5 厘米;小叶片椭圆形或倒卵形,长 1—2.3 厘米,宽 5—13 毫米;先端急尖或圆钝,基部楔形或宽楔形,稀近圆形,边缘有尖锐单锯齿,幼时齿尖常带腺体,上面无毛,下面有稀疏柔毛或近无毛,叶脉突起;小叶柄和叶轴有柔毛和散生小皮刺;托叶大部贴生于叶柄,离生部分披针形,先端长渐尖,下面有柔毛,全缘,边缘常有稀疏腺毛。花 2—4 朵排成伞形伞房状;花梗长 1—1.5 厘米,无毛或有少数腺毛;花直径 2.5—3 厘米,萼筒和萼片外面无毛或有少数腺毛,萼片卵状披针形,先端长渐尖,常有 1—2 对带形小裂片,边缘有腺毛;内面密被柔毛;花瓣粉红色,倒卵形,先端微凹,基部宽楔形;雄蕊多数;花柱结合成柱,密被柔毛,外伸,约与雄蕊等长。果未见。

产云南(丽江)。多生灌木丛中。

本种近似野蔷薇 *R. multiflora* Thunb., 惟后者托叶分裂呈篦齿状,花柱无毛,是其特异之点。

又本种与广东蔷薇 *R. kwangtungensis* Yü et Tsai 极为近似,但后者花为白色,直径 1.5—2 厘米,成伞房花序,花梗和萼筒密被柔毛和腺毛,小叶上面沿中脉有柔毛;而本种花为粉红色,直径 2.5—3 厘米,成伞形伞房状花序,花梗和萼筒均光滑无毛或有少数腺毛,小叶上面无毛,易于识别。

62. 光叶蔷薇 (中国树木分类学) 维屈蔷薇 (经济植物手册) 图版 69:3—4

Rosa wichuraiana Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. **25**:189. 1886; Schneid. Ill. Handb.