

采自广东鼎湖山。

本种与多花蔷薇 *R. multiflora* Thunb. 极为近似,但后者托叶为明显篦齿状分裂,花柱无毛,易于区别。

60b. 毛叶广东蔷薇 (变种)

R. kwangtungensis Yü et Tsai var. *mollis* Metc. in Journ. Arn. Arb. **21**:111. 1940.

本变种的特点为在花梗和萼片上密被绒毛状柔毛,小叶和叶轴上密被长柔毛,花重瓣。

产广东、广西、福建(厦门)。可能由栽培逸为野生。

60c. 重瓣广东蔷薇 (变种)

Rosa kwangtungensis Yü et Tsai var. *plena* Yü et Ku in Bull. Bot. Res. **1**(4):13. 1981.

本变种花重瓣,直径 2.5—3 厘米,花柱外伸,有长柔毛;托叶有显明锯齿。可能系经栽培后的变种。

产福建仓前山,广东鼎湖山有栽培。

61. 丽江蔷薇

Rosa lichiangensis Yü et Ku in Bull. Bot. Res. **1**(4):14. 1981.

攀援小灌木,高约 2 米;小枝圆柱形,细弱,散生短粗、稍弯曲的皮刺。小叶 3—5,连叶柄长 3—5 厘米;小叶片椭圆形或倒卵形,长 1—2.3 厘米,宽 5—13 毫米;先端急尖或圆钝,基部楔形或宽楔形,稀近圆形,边缘有尖锐单锯齿,幼时齿尖常带腺体,上面无毛,下面有稀疏柔毛或近无毛,叶脉突起;小叶柄和叶轴有柔毛和散生小皮刺;托叶大部贴生于叶柄,离生部分披针形,先端长渐尖,下面有柔毛,全缘,边缘常有稀疏腺毛。花 2—4 朵排成伞形伞房状;花梗长 1—1.5 厘米,无毛或有少数腺毛;花直径 2.5—3 厘米,萼筒和萼片外面无毛或有少数腺毛,萼片卵状披针形,先端长渐尖,常有 1—2 对带形小裂片,边缘有腺毛;内面密被柔毛;花瓣粉红色,倒卵形,先端微凹,基部宽楔形;雄蕊多数;花柱结合成柱,密被柔毛,外伸,约与雄蕊等长。果未见。

产云南(丽江)。多生灌木丛中。

本种近似野蔷薇 *R. multiflora* Thunb., 惟后者托叶分裂呈篦齿状,花柱无毛,是其特异之点。

又本种与广东蔷薇 *R. kwangtungensis* Yü et Tsai 极为近似,但后者花为白色,直径 1.5—2 厘米,成伞房花序,花梗和萼筒密被柔毛和腺毛,小叶上面沿中脉有柔毛;而本种花为粉红色,直径 2.5—3 厘米,成伞形伞房状花序,花梗和萼筒均光滑无毛或有少数腺毛,小叶上面无毛,易于识别。

62. 光叶蔷薇 (中国树木分类学) 维屈蔷薇 (经济植物手册) 图版 69:3—4

Rosa wichuraiana Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. **25**:189. 1886; Schneid. Ill. Handb.



1—2. 广东蔷薇 *Rosa kwangtungensis* Yü et Tsai: 1. 花枝, 2. 花纵剖面。3—4. 光叶蔷薇 *Rosa wichuraiana* Crép.: 3. 花枝, 4. 花纵剖面。5—6. 伞花蔷薇 *Rosa maximowicziana* Regel: 5. 果枝, 6. 花纵剖面。(吴彰桦绘)

Laubh. 1:540. f. 319 h—h'. 320c. 1905; Willmott, Gen. Ros. 1:59. t. 1911; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:335. 1915, et Journ. Arn. Arb. 13:311. 1932; 广州植物志 295. 1956; Ohwi, Fl. Jap. 540. 1965. — *R. luciae* Franch. et Roch. ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. 10:323. 1871. p.p.; Hook. f. in Curtis's Bot. Mag. 121: t. 7421. 1895. — *R. taquetii* Lév. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 7:199. 1909. p.p. quoad spec. fruct.; Willmott, Gen. Ros. 2:511. 1914; Nakai in Bull. Nat. Sci. Mus. Tokyo no. 31:59. 1952. — *R. acicularis* Lindl. var. *taquetii* (Lév.) Nakai in Bot. Mag. Tokyo 30:214. 1916. tantum quoad syn. cit. excl. Taquet 4228.

攀援灌木，高3—5米，枝条平卧，节上易生根；小枝红褐色，圆柱形，幼时有柔毛，不久即脱落；皮刺小，常带紫红色，稍弯曲。小叶5—7，稀9，连叶柄长5—10厘米，小叶片椭圆形、卵形或倒卵形，长1—3厘米，宽7—15毫米，先端圆钝或急尖，边缘有疏锯齿，上面暗绿色，有光泽，下面淡绿色，中脉突起，两面均无毛；顶生小叶柄长，侧面小叶柄短，总叶柄有小皮刺和稀疏腺毛；托叶大部贴生于叶柄，离生部分披针形，边缘有不规则裂齿和腺毛。花多朵成伞房状花序；花直径2—3厘米；花梗长6—20毫米，总花梗和花梗幼时有稀疏的柔毛，不久即脱落近无毛或散生腺毛；苞片卵形，不久即脱落；萼片披针形或卵状披针形，先端渐尖，全缘，外面近无毛，内面密被柔毛，边缘较密；花瓣白色，有香味，倒卵形，先端圆钝，基部楔形；花柱合生成束，伸出，外被柔毛，比雄蕊稍长。果实球形或近球形，直径8—18毫米，紫黑褐色，有光泽，有稀疏腺毛；果梗有较密腺毛，萼片最后脱落。花期4—7月，果期10—11月。

产浙江、广东、广西、福建、台湾。海拔150—500米。日本(琉球)、朝鲜有分布。

本种近似野蔷薇 *R. multiflora* Thunb., 惟后者托叶呈篦齿状分裂，花柱无毛，易于区别。又本种植株平卧，有长匍枝，花期较长，叶片光亮，花朵较密，并有香气为园艺家所重视，现已培育出很多园艺品种，广泛栽培。用于覆盖墙垣、石坡和棚架。

本种与日本产 *R. luciae* Franch et Roch. ex Crép. 极为近似，其主要区别在于后者小叶片常为5或7，顶生小叶比侧生小叶稍大，先端渐尖或急尖，托叶膜质，全缘，边缘有腺毛；而本种小叶片常为5—9，顶生小叶与侧生小叶大小相差不多，先端圆钝或急尖，托叶绿色，有锯齿及稀疏腺毛，可以识别。Koidzumi 视为日本产蔷薇的变种 *R. luciae* var. *wichuraiana* Koidz. in Journ. Coll. Sci. Tokyo 34(2):234. 1913.

与本种近似的种有小金樱 *Rosa taiwanensis* Nakai in Bot. Mag. Tokyo 30:238. 1916; Li, Woody Fl. Taiwan 300. 1963; 刘业经, 台湾木本植物志 187. 1972; Liu et Su in Fl. Taiwan 3:103. 1977.

攀援灌木，枝纤细，有散生钩状皮刺；羽状复叶，有小叶5—7片，椭圆形或卵形，顶生小叶最大，长1.8—3.6厘米，宽0.8—1.5厘米，侧生小叶较小，先端圆钝或急尖，基部圆形，两面无毛或在中脉稍被柔毛；叶轴有稀疏皮刺，无毛或稍有柔毛；托叶大部连生于叶柄，带

形,边有细尖锯齿,上面无毛,下面稍有柔毛。花2—9朵成顶生伞房花序,花梗及总花梗有柔毛及腺毛;萼片卵状长圆形,长6—7毫米,宽3—3.5毫米,先端急尖,反折,外面被柔毛及腺毛,内面被白色绒毛;花瓣宽倒卵形,先端微凹;花柱有毛,长4—5毫米。果实球形,直径7—8毫米,熟时红色,萼片脱落。

特产我国台湾中央山脉中海拔地区。

本种与光叶蔷薇 *R. wichuraiana* Crép. 之异点,在于本种叶片花果均较小,小叶下面及花梗、总花梗均有柔毛,是否同物异名,有待进一步研究。

63. **伞花蔷薇**(东北木本植物图志) 牙门太、牙门杠(东北),钩脚藤、酸溜溜、刺玫果(辽宁) 图版 69:5—6

Rosa maximowicziana Regel. in Acta Hort. Petrop. **5**:378. 1878; Nakai, Fl. Sylv. Kor. **7**:26. t. 1. 1918; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **13**:312. 1932; Nakai in Bull. Nat. Sci. Mus. Tokyo no. **31**:58. 1952. p. p.; 东北木本植物图志 311. 图版 108. 图 224. 1955; 东北植物检索表 154. 图版 48. 图 5. 1959. ——*R. fauriei* Lév. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **7**:199. 1909. p. p. excl. spec. Faurie 99; Nakai in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo **31**:482. 1911.

小灌木,具长匍枝,成弓形弯曲,散生短小而弯曲皮刺,有时被刺毛。小叶7—9,稀5,连叶柄长4—11厘米,小叶片卵形、椭圆形或长圆形,稀倒卵形,长1.5—3(—6)厘米,宽1—2厘米,先端急尖或渐尖,基部宽楔形或近圆形,边缘有锐锯齿,上面深绿色,无毛,下面色淡,无毛或在中脉上有稀疏柔毛,或有小皮刺和腺毛;托叶大部贴生于叶柄,离生部分披针形,边缘有不规则锯齿和腺毛。花数朵成伞房状排列;苞片长卵形,边缘有腺毛;萼片三角卵形,先端长渐尖,全缘,有时有1—2裂片,内外两面均有柔毛,内面较密,萼筒和萼片外面有腺毛;花直径3—3.5厘米;花梗长1—2.5厘米,有腺毛;花瓣白色或带粉红色,倒卵形,基部楔形,花柱结合成束,伸出,无毛,约与雄蕊等长。果实卵球形,直径8—10毫米,黑褐色,有光泽,萼片在果熟时脱落。花期6—7月,果期9月。

产辽宁、山东等省。多生于路旁、沟边、山坡向阳处或灌丛中。朝鲜及苏联远东地区有分布。

果实供药用,又可供砧木用,嫁接蔷薇或月季品种。嫩枝可食用,生食带甜味。

本种近似多花蔷薇 *R. multiflora* Thunb., 后者小叶片下面常被短柔毛,托叶具显明篦齿状分裂,花朵和果实均较小,可以区别。

64. **银粉蔷薇**(中国植物学杂志) 银莲花蔷薇(拉汉种子植物名称),红枝蔷薇(江苏南部种子植物手册) 图版 68:4

Rosa anemoniflora Fort. ex Lindl. in Journ. Hort. Soc. Lond. **2**:315. 1874; Willmott, Gen. Ros. **1**:67. t. 1911; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. **2**:336. 1915. ——*R. sempervirens* β *anemoniflora* Regel in Acta Hort. Petrop. **5**:367. 1878. ——*R. triphylla*