

形,边有细尖锯齿,上面无毛,下面稍有柔毛。花2—9朵成顶生伞房花序,花梗及总花梗有柔毛及腺毛;萼片卵状长圆形,长6—7毫米,宽3—3.5毫米,先端急尖,反折,外面被柔毛及腺毛,内面被白色绒毛;花瓣宽倒卵形,先端微凹;花柱有毛,长4—5毫米。果实球形,直径7—8毫米,熟时红色,萼片脱落。

特产我国台湾中央山脉中海拔地区。

本种与光叶蔷薇 *R. wichuraiana* Crép. 之异点,在于本种叶片花果均较小,小叶下面及花梗、总花梗均有柔毛,是否同物异名,有待进一步研究。

63. **伞花蔷薇**(东北木本植物图志) 牙门太、牙门杠(东北),钩脚藤、酸溜溜、刺玫果(辽宁) 图版 69:5—6

Rosa maximowicziana Regel. in Acta Hort. Petrop. **5**:378. 1878; Nakai, Fl. Sylv. Kor. **7**:26. t. 1. 1918; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **13**:312. 1932; Nakai in Bull. Nat. Sci. Mus. Tokyo no. **31**:58. 1952. p. p.; 东北木本植物图志 311. 图版 108. 图 224. 1955; 东北植物检索表 154. 图版 48. 图 5. 1959. ——*R. fauriei* Lév. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **7**:199. 1909. p. p. excl. spec. Faurie 99; Nakai in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo **31**:482. 1911.

小灌木,具长匍枝,成弓形弯曲,散生短小而弯曲皮刺,有时被刺毛。小叶7—9,稀5,连叶柄长4—11厘米,小叶片卵形、椭圆形或长圆形,稀倒卵形,长1.5—3(—6)厘米,宽1—2厘米,先端急尖或渐尖,基部宽楔形或近圆形,边缘有锐锯齿,上面深绿色,无毛,下面色淡,无毛或在中脉上有稀疏柔毛,或有小皮刺和腺毛;托叶大部贴生于叶柄,离生部分披针形,边缘有不规则锯齿和腺毛。花数朵成伞房状排列;苞片长卵形,边缘有腺毛;萼片三角卵形,先端长渐尖,全缘,有时有1—2裂片,内外两面均有柔毛,内面较密,萼筒和萼片外面有腺毛;花直径3—3.5厘米;花梗长1—2.5厘米,有腺毛;花瓣白色或带粉红色,倒卵形,基部楔形,花柱结合成束,伸出,无毛,约与雄蕊等长。果实卵球形,直径8—10毫米,黑褐色,有光泽,萼片在果熟时脱落。花期6—7月,果期9月。

产辽宁、山东等省。多生于路旁、沟边、山坡向阳处或灌丛中。朝鲜及苏联远东地区有分布。

果实供药用,又可供砧木用,嫁接蔷薇或月季品种。嫩枝可食用,生食带甜味。

本种近似多花蔷薇 *R. multiflora* Thunb., 后者小叶片下面常被短柔毛,托叶具显明篦齿状分裂,花朵和果实均较小,可以区别。

64. **银粉蔷薇**(中国植物学杂志) 银莲花蔷薇(拉汉种子植物名称),红枝蔷薇(江苏南部种子植物手册) 图版 68:4

Rosa anemoniflora Fort. ex Lindl. in Journ. Hort. Soc. Lond. **2**:315. 1874; Willmott, Gen. Ros. **1**:67. t. 1911; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. **2**:336. 1915. ——*R. sempervirens* β *anemoniflora* Regel in Acta Hort. Petrop. **5**:367. 1878. ——*R. triphylla*

Roxb. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**:247. 1887. pro syn.; Rehd. Man. Cult. Trees. Shrub. ed. 2. 446. 1940.

攀援小灌木，枝条圆柱形，紫褐色；小枝细弱，无毛；散生钩状皮刺和稀疏腺毛。小叶3，稀5，连叶柄长4—11厘米；小叶片卵状披针形或长圆披针形，长2—6厘米，宽0.8—2厘米，先端渐尖，基部圆形或宽楔形，边缘有紧贴细锐锯齿，上面中脉下陷，下面苍白色，中脉突起，两面无毛；叶柄无毛，有散生皮刺和稀疏腺毛；托叶狭，极大部分贴生于叶柄，仅顶端分离，离生部分披针形，边缘有带腺锯齿。花单生或成伞房花序，稀有伞房圆锥花序；花直径2—2.5厘米，花梗长1—3.5厘米，无毛，有稀疏的腺毛；萼片披针形，先端渐尖，全缘，外面无毛，内面有短柔毛，边缘有稀疏腺毛，花后反折；花瓣粉红色，倒卵形，先端微凹，基部楔形；花柱结合成束，伸出，有柔毛，比雄蕊稍长。果实卵球形，直径约7毫米，紫褐色，无毛。花期3—5月，果期6—8月。

产福建。多生于山坡、荒地、路旁、河边等处。海拔400—1000米。

本种有重瓣变型，花淡粉红色，点缀枝头可供观赏，华东庭园有栽培。攀援藤本常具3片卵状披针形小叶，在合柱组中较易识别。


系7.全缘托叶系——Ser. **Brunonianae** Yü et Ku in Bull. Bot. Res. **1**(4):5. 1981.

本系有下列11种。

65. **复伞房蔷薇**(秦岭植物志) 勃朗蔷薇(经济植物手册)，万朵刺、倒钩刺、白刺玫(陕西) 图版68:5—6

Rosa brunonii Lindl. Ros. Monogr. 120. t. 14. 1820; Hook. in Curtis's Bot. Mag. **69**: t. 4030. 1843; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. **2**:306. 1915; Byhouwer in Journ. Arn. Arb. **10**:87. 1929; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:525. 1933; Kitamura in Funa & Fl. Nepal Himal. **1**:156. 1952—53; Hara et Ohashi Fl. E. Himal. 127. 1966, et **2**:55. 1971; Hara in Enum. Flow. Pl. Nepal **2**:143. 1979 ——— *R. moschata* var. *nepalensis* Lindl. in Bot. Reg. **10**: t. 829. 1824; Willmott, Gen. Ros. **1**:37. t. 1911. ——— *R. pubescens* Roxb. Fl. Ind. ed. 2(2). 514. 1832. ——— *R. clavigera* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **13**:338. 1914, et Cat. Pl. Yunnan 234. 1917 ——— *R. moschata* auct. non Mill. 1874; Brandis, For. Fl. Brit. Ind. 201. 1874; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **2**:367. 1878.

攀援灌木，高4—6米；小枝圆柱形，幼时有柔毛，以后脱落减少并有短而弯曲的皮刺。小叶通常7，近花序小叶常为5或3，连叶柄长6—9厘米；小叶片长圆形或长圆披针形，长3—5厘米，宽1—1.5厘米，先端渐尖或急尖，基部近圆形或宽楔形，边缘有锯齿，上面微被柔毛，稀无毛，下面密被柔毛；小叶柄和叶轴密被柔毛和散生钩状小皮刺；托叶大部贴生于叶柄，离生部分披针形，先端渐尖，边缘有腺，两面均被毛。花多朵排成复伞房状花序；花梗长2.8—3.5厘米，被柔毛和稀疏腺毛；花直径3—5厘米；萼筒倒卵形，外被柔毛；萼片



1—3.粉团蔷薇 *Rosa multiflora* Thunb. var. *cathayensis* Rehd. et Wils.: 1.花枝, 2.花纵剖面, 3.果实。4.银粉蔷薇 *Rosa anemoniflora* Fort.: 花枝。5—6.复伞房蔷薇 *Rosa brunonii* Lindl.: 5.花枝, 6.果实(王金凤绘)